# 용법용량

성인 (노인 환자 포함) 에서는 권장용량으로서 1회 50mg을 1일 1회 경구투여한다.

이 약은 음식과 함께 또는 음식과 상관없이 투여할 수 있으며, 물과 함께 삼켜야 하며 씹거나 부수어서는 안 된다.

다음은 신장애 및 간장애 환자에 대한 강력한 CYP3A 저해제 유무 하에서의 일일권장용량 표이다 ('사용상의 주의사항 5)상호작용' 참조)

| 구분 | 중증도 | 강력한 CYP3A 저해제[3] | |
|---|---|---|---|
| | | 저해제 무 | 저해제 유 |
| 신장애[1] | 경증 | 50 mg | 25 mg |
| | 중등도 | 50 mg | 25 mg |
| | 중증 | 25 mg | 권장되지 않는다 |
| 간장애[2] | 경증 | 50 mg | 25 mg |
| | 중등도 | 25 mg | 권장되지 않는다 |

(1) 경증: GFR 60~89 mL/min/1.73m$^2$;중등도: GFR 30~59 mL/min/1.73m$^2$;중증: GFR 15~29 mL/min/1.73m$^2$.

(2) 경증: Child-Pugh Class A; 중등도: Child-Pugh Class B.

(3) 강력한 CYP3A 저해제는 '5)상호작용' 참조