

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 두통, 치통, 발치(이를 뽑음)후 동통(통증), 인후(목구멍)통, 귀의 통증, 관절통, 신경통, 요(허리)통, 근육통, 건통(어깨통증), 타박통, 골절통, 염좌통(뻘 통증), 월경통(생리통), 외상(상처)통의 진통과 오한(춥고 떨리는 증상), 발열시의 해열에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

성인은 1회 1정 1일 3회까지 공복시를 피해 복용합니다. 복용간격은 4시간 이상으로 합니다. 이 약은 원칙적으로 단기간 복용합니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

매일 세잔 이상 정기적 음주자가 이 약 또는 다른 해열진통제를 복용할 때는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 간손상을 일으킬 수 있습니다. 아세트아미노펜으로 일일 최대 용량(4,000 mg)을 초과하여 복용하지 마십시오. 간손상을 일으킬 수 있습니다. 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용하지 마십시오.

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 또는 경험자, 다른 해열진통제(비스테로이드성 소염제), 감기약 복용시 천식발작 유발 또는 경험자, 글루코스-6-인산 탈수소효소결핍증, 급성 간혈성(시간 간격을 두고 되풀이하여) 포르피린증, 과립백혈구감소증, 중증 간장애, 중증 신장애, 출혈 소인, 소화성궤양, 15세 미만의 소아,심한 혈액 이상, 심한 심장 기능저하 환자는 이 약을 복용하지 마십시오. 이 약을 복용하기 전에 알레르기 체질, 약에 의한 알레르기 증상(발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등) 경험자, 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 15세 이상의 청소년, 갑상샘질환, 당뇨병, 고혈압, 몸이 약한 사람, 고열, 고령자, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되는 사람, 간장애, 신장(콩팥)장애, 소화성궤양, 혈액이상 또는 경험자, 출혈경향이 있는 환자, 심장기능이상, 과민증 경험자, 기관지 천식 환자는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 수회(5~6회) 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 의사 또는 약사의 지시없이 통증에 10일 이상(성인)또는 5일 이상(소아) 복용하지 않고 발열에 3일 이상 복용하지 마십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품, 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제, 알코올, 다른 소염진통제와 함께 이 약을 복용하지 마십시오. 당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제, 와파린, 리튬, 티아지드계 이뇨제, 플루클록사실린과 함께 복용 시 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

속 증상(호흡곤란, 온몸이 붉어짐, 혈관부기, 두드러기 등), 천식발작, 혈소판 감소, 과립구감소, 용혈성빈혈, 메트헤모글로빈혈증, 혈소판기능 저하(출혈시간 연장), 청색증, 얼굴부기, 호흡곤란, 땀이 남, 저혈압, 구역, 구토, 식욕부진, 위장출혈, 소화성궤양, 천공(뚫림), 발진, 피부점막안증후군(스티븐스-존슨증후군), 독성표피괴사용해(리엘증후군: 고열을 수반하며 발진, 발적 충혈되어 붉어짐, 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우), 전신의 나른함, 황달, 간질성폐렴(기침, 숨이참, 호흡곤란, 발열), 고음이온차 대사성 산증(HAGMA), 간기능이상, 고정발진, 과도한 체온강하, 허탈, 사지냉 등이 나타나는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.