

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 기관지천식, 만성기관지염, 기관지확장증, 폐결핵, 폐기종, 상기도염(인·후두염), 폐화농증, 폐렴, 낭성섬유증, 수술후 폐합병증의 객담배출곤란과 기관지조영, 기관지경 검사, 폐암 세포진, 기관절개술의 전·후 처치에 사용됩니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

이 약은 주사용염화나트륨용액, 흡입용염화나트륨용액, 주사용멸균증류수, 흡입용멸균증류수를 사용하여 더 낮은 농도로 희석하여 사용할 수 있습니다. 안면마스크, 마우스피스, 기관누공형성술을 이용한 분무요법은 1~10 mL를 2~6시간마다 분무합니다. 추천량은 3~5 mL를 1일 3~4회 분무합니다. 분무텐트 및 흡입기(Croupette)를 이용한 분무요법은 특별한 경우에 필요한 방법으로 환자의 개인적 요구 및 투여방법의 편의도에 따라 개인적으로 사용합니다. 이 투여방법에는 많은 양의 용액이 필요하여, 때때로 1회 치료 시 300 mL 정도까지 요구되는 수도 있습니다. 추천량은 치료기간동안 천막이나 흡입기내에 매우 농도가 짙은 안개 같은 상태를 유지할 수 있는 용량이어야 합니다. 간헐적 또는 계속적으로 장기간 투여하는 것이 바람직합니다. 직접 주입하는 경우 1~2 mL를 1시간마다 투여합니다. 기관누공형성술을 한 환자의 정기적 치료에는 1~2 mL를 기관누공을 통해 1~4시간마다 투여합니다. 국소마취와 직접 절개를 하여 기관내로 작은 플라스틱 카테타를 삽입하여 폐기관 수지상 구조의 특정부분에 직접 투여하는 경우 카테타와 연결된 주사기를 이용하여 2~5 mL를 1~4 시간마다 투여합니다. 기관지내 경피 카테타를 사용하여 투여하는 경우 1~4시간마다 이 약 1~2 mL를 카테타에 연결된 주사기로 투여합니다. 진단용 기관지 조영 시 기관지 조영 실시전에 1~2 mL를 2~3회 분무용법 또는 기관지내 주입법에 의해 투여합니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 환자는 이 약을 사용하지 마십시오. 이 약을 사용하기 전에 기관지천식, 호흡기능부전을 수반한 환자, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 소아, 고령자는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 주사제 또는 점안제로는 사용하지 마십시오. 분무요법후 안면 마스크가 얼굴에 밀착되는 수가 있으나 물로 세척하면 쉽게 떨어집니다.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

항생물질, 테트라사이클린, 에리트로마이신, 브롬헥신 등과 함께 복용(사용)하는 경우 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

때때로 기관지폐색, 기관지경련, 발진, 호흡곤란, 드물게 아나필락시스 등이 나타나는 경우 즉각 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오. 가벼운 취기(유황취), 때때로 구역, 구토, 식욕부진, 드물게 혈담, 오한, 발열, 비루, 구내염, 졸음, 흉부압박감, 기관 및 기관지에 대한 자극 등이 나타날 수 있습니다.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

빛을 피해 실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.