

## e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 근육통, 신경통, 외상후 및 수술후 통증, 두통, 치통, 귀통증의 경증 또는 중등도 통증의 완화에 사용됩니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

성인은 1회 1~2정(125~250 mg), 1일 3회 복용합니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

소화성궤양 환자, 약물에 기인하여 위·십이지장에 동요 발현시, 이 약에 과민증 환자, 아스피린이나 다른 비스테로이드성 소염진통제(COX-2 억제제 포함)에 천식, 두드러기 또는 알레르기 반응 경험자, 관상동맥 우회술(CABG) 전후에 발생하는 통증의 치료 환자, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 심한 간장애, 심한 신장애, 심한 심부전, 크론병 또는 궤양성 대장염과 같은 염증성 장질환 환자는 이 약을 복용하지 마십시오. 이 약을 복용하기 전에 소화성궤양의 경험자, 소아 및 고령자, 고혈압, 혈액저류 또는 심부전, 기관지천식 환자, 간장애, 신장애 환자 또는 경험자는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

이 약을 복용하는 동안 다른 비스테로이드성 소염진통제, ACE 억제제 또는 안지오텐신 II 수용체 길항제, 아스피린, 이뇨제, 리튬, 메토틱렉세이트, 쿠마린계 항응고제(와파린 등), 시클로스포린 및 타크로리무스, 항혈소판제 및 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRI), 코르티코스테로이드를 함께 복용하지 마십시오. 이 약을 복용하기 전에 미소프로스톨 등으로 소화성궤양 치료를 병행하고 있는 환자는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

구역, 구토, 설사, 변비, 복통, 위장출혈, 소화성궤양 및 천공, 드물게 쇼크, 발진, 가려움, 빈혈, AST와 ALT의 상승, 졸음, 두통, 어지러움, 식은땀, 한기, 이상황홀감 등이 나타나면 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

