

## e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 네오마이신 감수성 세균에 의해 2차 감염된 코르티코이드 반응성 피부질환의 초기 치료(피부염, 감염된 상처)에 사용됩니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

1일 1~2회 적당량을 환부(질환 부위)에 바릅니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약 또는 스트렙토마이신, 카나마이신, 겐타마이신, 네오마이신 등 아미노글루코사이드계 항생 물질 또는 바시트라신에 과민증 환자, 피부감염증(피부결핵, 매독, 칸디다증, 백선, 대상포진, 단순포진, 수두, 종두증, 옴, 사면발이), 고막 천공이 있는 습진성 외이도염, 궤양(베체트병 제외), 제2도 심재성 이상의 화상 및 동상, 입주위피부염, 보통여드름, 주사 환자는 이 약을 사용하지 마십시오. 눈 또는 눈주위에 사용하지 마십시오. 이 약을 사용하기 전에 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부, 유 · 소아, 프로필렌글리콜에 과민증 환자 또는 경험자는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 정해진 용법과 용량을 잘 지키십시오. 어린이에게 투여할 경우 보호자의 지도 감독하에 투여하십시오. 안과용으로 사용하지 마십시오. 만일 눈에 들어간 경우에는 즉시 물로 씻고, 증상이 심할 경우에는 안과 의사의 치료를 받으십시오. 화장이나 면도 후 등 치료 이외의 목적으로 사용하지 마십시오. 의사의 감독없이 밀봉봉대법을 사용하지 마십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

전염성농가진, 모낭염, 바이러스성 감염증, 부스럼, 피부자극, 자통, 발열, 작열감, 발진, 발적, 홍조, 가려움, 부종, 구진, 소수포, 피부건조, 농포성피부염, 알레르기성 접촉피부염, 2차감염, 피부거칠어짐, 땀띠, 상처악화, 욕창, 농포증, 안검피부에 사용시 안압 상승, 녹내장 등이 나타나는 경우 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 전신 흡수로 인해 가역적인 시상하부-뇌하수체-부신축의 억제, 쿠싱증후군, 과혈당증, 당뇨와 시력장애 등이 나타날 수 있습니다.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.