용법용량

(4% 액제)

1. 수술시의 손 소독 : 이 약 5mL를 손과 팔꿈치까지 적용하고 약 3분간 솔 또는 스폰지를 사용하여 문지른다. 손톱, 표피, 손가락 사이의 부위에 특히 주의하며 문지른다. 따뜻한 물로 씻어내고 다시 이 약 5mL로 3분간 씻고 물로 깨끗이 세척한 후 완전히 말린다.

2. 보건위생종사자의 손 소독 : 이 약 5mL를 손과 팔꿈치까지 적용하고 1분간 씻는다. 물로 깨끗이 세척한 후 완전히 말린다.

(5% 액제)

글루콘산클로르헥시딘으로서 용도에 따라 다음의 농도로 희석하여 사용한다.

① 손 및 피부의 소독 : 0.1 - 0.5% 수용액

② 수술부위의 피부소독, 의료용구의 소독 : 0.1 - 0.5% 수용액 또는 0.5% 에탄올용액

③ 가구, 기구 등의 소독, 피부의 창상부위 소독 : 0.05% 수용액

(20% 액제)

글루콘산클로르헥시딘으로서 용도에 따라 다음의 농도로 희석하여 사용한다.

① 손 및 피부의 소독 : 0.1 - 0.5% 수용액

② 수술부위의 피부소독, 의료용구의 소독 : 0.1 - 0.5% 수용액 또는 0.5% 에탄올용액

③ 가구, 기구 등의 소독, 피부의 창상부위 소독 : 0.05% 수용액

④ 산부인과, 비뇨기과에서의 외음, 외성기의 피부소독 : 0.02% 수용액

(크림제)

1일 수회 환부에 적당량을 바른다.