

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 피부사상균에 의한 피부진균(곰팡이)감염증(족부백선(발백선증, 무좀), 고부백선(대퇴부백선)(완선(사타구니백선)), 체부백선), 어루러기, 피부칸디다증에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

1일 1~2회 환부(질환부위)에 바릅니다. 질환에 따른 치료기간은 족부백선(발백선증, 무좀)인 경우 1일 1회 1주, 지간(발가락사이)형 족부백선(발백선증, 무좀)인 경우 1일 2회 1주, 족저형(발바닥) 족부백선(발백선증, 무좀)인 경우 1일 2회 2주, 체부백선, 고부백선(대퇴부백선)(완선(사타구니백선))인 경우 1~2주, 피부칸디다증인 경우 1~2주, 어루러기인 경우 2주간 사용합니다. 사용 전에 환부(질환 부위)를 깨끗이 씻고, 완전히 건조시킨후 1일 1~2회 환부(질환부위)에 얇게 펴 부드럽게 문지르면서 바릅니다. 특히 밤에는, 피부가 겹치는 부위의 감염(유방밑, 손·발가락 사이, 둔부(엉덩이, 볼기) 사이, 서혜부)의 경우 도포 부위를 거즈 조각으로 덮을 수 있습니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 환자, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부, 소아는 이 약을 사용하지 마십시오. 이 약을 사용하기 전에 알코올이 자극할 수 있는 병변(병에 의한 몸의 변화)이 있는 환자는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 의사의 지시가 없는 한 밀봉봉대법 또는 포장법을 사용하지 마십시오. 칸디다증에 산성비누를 사용하지 마십시오. 이 약은 외용으로만 사용하십시오. 안과용으로 각막, 결막에 사용하지 않고, 만일 눈에 들어갔을 경우 충분한 양의 물로 완전히 씻어 내십시오. 손톱, 두피, 입주위 및 질부위, 균열(갈라짐), 미란(긁무름) 부위에 사용하지 마십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

과민반응, 드물게 눈 자극, 흔하게 피부박리(벗겨짐), 가려움, 흔하지 않게 피부 병변(병에 의한 몸의 변화), 딱지, 피부질환, 색소침착이상, 홍반(붉은 반점), 피부 화끈감, 드물게 피부 건조, 접촉 피부염, 습진, 발진, 흔하지 않게 통증, 적용부위 통증, 적용부위 자극감 등이 나타나는 경우 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.