

## 용법용량

이 약은 반드시 비강내로 투여하여야 한다. 이 약은 강력한 항염증 작용을 가지고 있으나 국소적으로 비강점막에 사용시 전신작용은 나타나지 않는다.

충분한 치료효과를 얻기 위해서는 반드시 규칙적으로 사용해야 하며 때때로 최대 치료효과가 투여후 즉시 나타나지 않고 3-4일만에 나타날 수 있으므로 환자는 이를 염두에 두어야 한다.

### 1. 성인 및 12세 이상의 소아

한쪽 비강으로 2번( $2 \times 50 \mu\text{g}$ )을 분무하고 이때 다른쪽 비강은 손가락으로 막는다. 다음에 다른쪽 비강에도 같은 조작으로 2번 분무한다. 1회 각 비강에 2번씩, 1일 1회 아침에 투여하는 것이 바람직하다. 경우에 따라서는 1회 각 비강에 2번씩, 1일 2회 투여가 필요할 수도 있다. 그러나 1일 최대투여량은 각 비강에 대하여 4번을 초과해서는 안된다.

### 2. 12세 미만의 소아

1) 계절성 알레르기성 비염 : 4-11세 소아의 경우 1일 1회에 각 비강에 1번씩( $50 \mu\text{g}$ )을 분무흡입한다. 1일 최대 투여량은 각 비강에 대하여 2번( $2 \times 50 \mu\text{g}$ )을 초과해서는 안된다.

2) 다년성 비염 : 소아에 대하여는 이 약을 추천할 만한 임상 자료가 충분하지 않다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다