

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 멀미에 의한 어지러움, 구토, 두통의 예방 및 완화에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

멀미의 예방에는 승차 30분 전에 1회 복용량을 복용합니다. 연령구분에 따른 1회 복용량은 만 15세 이상은 1병(30 mL), 만 11세 이상~만 15세 미만은 $\frac{2}{3}$ 병(20 mL), 만 7세 이상~만 11세 미만은 $\frac{1}{2}$ 병(15 mL), 만 3세 이상~만 7세 미만은 $\frac{1}{3}$ 병(10 mL)입니다. 필요시 추가 복용할 경우에는 1회 복용량을 4시간 이상의 간격을 두고 복용하며 1일 복용횟수는 2회를 한도로 합니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

수유부, 만 3세 미만의 영·유아는 이 약을 복용하지 마십시오. 이 약을 복용하기 전에 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등) 경험자, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 녹내장(눈의 통증, 눈의 침침함 등), 배뇨(소변을 눅)장애, 심장장애, 허약자, 노인, 폐기종 혹은 만성 기관지염과 같은 호흡기질환 환자, 황색5호 성분에 과민증 환자는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 정해진 용법과 용량을 잘 지킵시오. 어린이에게 투여할 경우 보호자의 지도 감독하에 투여하십시오. 이 약 복용 후 졸음이 나타날 수 있으므로 운전 및 기계조작 시 주의하십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

다른 진통제, 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제, 진해거담제, 위장진통·진경제와 함께 복용하지 마십시오. 복용 중에는 알코올성 음료를 피하십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

발진, 충혈되서 붉어짐, 가려움, 두통, 안면홍조, 눈부심, 배뇨(소변을 눅)장애, 구갈(목마름) 또는 변비 등이 나타나는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.