

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 위통, 속쓰림, 체함, 구역에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

15세 이상~80세 미만 성인은 1회 2정씩 복용합니다.필요시 4시간 간격으로 1회 2정씩, 1일 3회까지 복용할 수 있습니다.단, 1일 3회(6정)를 초과하여 복용하지 마십시오.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

히스타민 H₂-수용체 길항제에 과민증 환자, 투석요법을 받고 있는 환자, 혈액질환, 신장·간장질환, 위·십이지장질환, 천식, 류마티스 등의 면역계질환 환자, 적혈구감소증, 혈소판감소증, 백혈구감소증 등의 혈액이상 경험자, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부, 15세 미만 소아 및 80세 이상 고령자, 스테로이드제, 항생물질, 항암제, 아졸계 항진균제를 복용중인 환자는 이 약을 복용하지 마십시오.이 약을 복용하기 전에 65세 이상 고령자, 약에 과민증 경험자, 인후통, 기침, 고열, 원인불명의 체중감소, 복통 환자, 신장병 경험자는 의사 또는 약사와 상의하십시오.정해진 용법과 용량을 잘 지키십시오.3일간 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.복용 후 졸음, 어지러움, 혼란감이 나타날 수 있으므로 운전 또는 기계조작을 피하십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

스테로이드제, 항생물질, 항암제, 아졸계 항진균제, 다른 위장약과 함께 복용하지 마십시오.기관지확장제(테오필린 등), 혈액응고저지제(와파린 등), 항전간제(페니토인 등), 벤조디아제핀계 약제(디아제팜, 트리아졸람 등), 삼환계항우울제(이미프라민 등), 협심증·고혈압 치료제(베타-차단제 프로프라놀롤 등), 칼슘길항제(니페디핀 등), 부정맥치료제(멕실레틴 등), 마크로라이드계 항생물질(테트라사이클린 등), 뉴퀴놀론계 항균제(오픈록사신 등), 테트라사이클린계 항생물질과 함께 사용 시 의사 또는 약사와 상의하십시오.복용 중에는 알코올성 음료를 피하십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

두드러기, 부종, 가슴답답함과 동시에 안색창백, 수족냉증, 식은땀, 숨가쁨, 고열을 동반한 발진, 발적, 열상의 수종 등의 심한 증상이 전신의 피부, 입, 눈의 점막에 나타나는 경우, 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움, 부

중), 변비, 설사, 두통, 발열, 권태감, 탈력감, 감기 증상, 하지 · 점막하출혈, 사지저림 및 굳은감, 두근거림, 황달, 전신부종, 혈뇨 등이 나타나는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.