

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 피부사상균에 의한 피부진균감염증(족부백선, 고부백선(완선), 체부백선)과 피티로스포룸 올비쿨라레균에 의한 어루러기 및 피부칸디다증에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

1일 1~2회 환부(질환 부위)에 바릅니다. 질환에 따른 치료기간은 족부백선(발백선증, 무좀)인 경우 1일 1회 1주, 지간(발가락사이)형 족부백선(발백선증, 무좀)인 경우 1일 2회 1주, 족저형(발바닥) 족부백선(발백선증, 무좀)인 경우 1일 2회 2주, 체부백선, 고부백선(대퇴부백선)(완선(사타구니백선))인 경우 1~2주, 피부칸디다증인 경우 1~2주, 어루러기인 경우 2주간 사용합니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 환자, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부, 소아는 이 약을 사용하지 마십시오. 의사의 지시가 없는 한 밀봉봉대법 또는 포장법을 사용하지 마십시오. 칸디다증일 경우에는 산성 비누를 사용하지 마십시오. 이 약은 외용으로만 적용하십시오. 안과용으로 각막, 결막에 사용하지 않고, 실수로 눈에 들어갔을 경우 이 약이 눈을 자극할 수 있으며, 드물게 잠재성 진균(곰팡이) 감염이 악화될 수 있으므로 충분한 양의 물로 완전히 씻어 내십시오. 손톱, 두피, 입주위 및 질부위에 사용하지 마십시오. 치료기간 이후에도 증상이 개선되지 않으면 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

발진을 동반한 과민반응, 과도한 자극, 피부의 두드러기, 발적, 발진, 홍반, 가려움, 자극감, 국소의 접촉피부염, 피부박리, 상처의 딱지, 색소침착이상, 자통, 작열감 등이 나타나는 경우 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.