용법용량

(경구)

o 류마티양 관절염, 골관절염, 강직성 척추염, 연조직손상, 비관절 류마티스질환, 급성통풍, 건선성 관절염 : 성인 이부프로펜으로서 1회 200-600mg 1일 3-4회 경구투여한다. 1일 최고 3200mg까지 투여할 수 있다.

o 연소성 류마티양 관절염:

1일 체중 kg당 30-40mg을 3-4회 분할 경구투여한다.

o 경증 및 중등도의 동통, 감기:

성인 1회 200-400mg 1일 3-4회 경구투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

o 어린이는 다음 1회 용량을 1일 3-4회 경구투여한다.

체중이 30kg미만인 어린이는 1일량이 500mg(25ml)을 초과해서는 안되며 공복시 투여는 피하는 것이 바람 직하다.

어린이 1회 용량:

11-14세 : 200-250mg (10-13ml)

7-10세: 150-200mg (8-10ml)

3-6세:100-150mg (5-8ml)

1- 2세: 50-100mg (3-5ml)

(좌제)

어린이: 이부프로펜으로서 1회 체중 kg당 3.0-6.0mg 1일 2회 직장내 깊이 삽입한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.