

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 급·만성기관지염, 기관지천식, 기관지확장증, 인두염의 객담(가래)배출곤란과 만성부비동염의 배농, 삼출성중이(가운데귀)염의 배액에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

성인은 초기에 1회 15 mL (750 mg)씩, 1일 3회, 증상이 나아지면 1회 10 mL (500 mg)씩, 1일 3회, 13세 이상~18세 이하는 1회 5 mL~10 mL (250~500 mg)씩, 1일 3~4회, 6세 이상~12세 이하는 1회 5 mL (250 mg)씩, 1일 3회, 2세 이상~5세 이하는 5 mL~10 mL (250~500 mg)을 4회 분할하여 복용합니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 환자, 2세 미만의 소아, 위·십이지장궤양 환자는 이 약을 복용하지 마십시오.이 약을 복용하기 전에 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부, 고령자, 간장애, 심장애 환자, 카라멜에 과민증 환자 또는 경험자는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

항생물질, 트리메토크놀염산염을 함유하는 시럽제와 함께 복용 시 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

드물게 구역, 구토, 복부(배부분)팽만감, 위장관출혈, 가슴쓰림, 때때로 식욕부진, 위부불쾌감, 설사, 구갈(목마름), 민감한 환자에서 구내염(입안염), 발진, 홍반(붉은 반점), 습진, 드물게 두통, 민감한 환자에서 비염(코염), 때때로 가려움, 심계항진(두근거림), 콧물, 전신의 압박감, 피부점막안증후군(스티븐스-존슨증후군), 독성표피괴사용해(리엘증후군), AST, ALT, ALP, LDH 상승 등을 동반한 간기능장애, 황달, 쇼크 등이 나타나는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오.어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.