

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 감기 또는 알레르기성 및 혈관운동성 비염에 의한 재채기, 콧물, 코막힘, 눈물 증상의 완화와 부비동염에 의한 비출혈의 일시적 완화에 사용됩니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

만 12세 이상의 소아 및 성인은 4시간마다 10 mL씩 복용하되, 24시간동안 60 mL를 초과하지 않으며, 의사의 지시에 따르십시오. 만 6세 이상~12세 미만의 소아는 4시간마다 5 mL씩 복용하되, 24시간동안 30 mL를 초과하지 않으며, 의사의 지시에 따르십시오. 만 2세 이상~6세 미만의 소아는 의사의 지시에 따르십시오.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

아민계 교감신경항진제, 항히스타민제, 이 약에 과민증 환자, 특이체질 환자, 수유부, 중증의 고혈압, 중증의 관상동맥질환 환자, 협우각성 녹내장, 뇨저류, 소화성 궤양, 천식, 폐기종, 만성폐질환, 숨이 차거나 호흡곤란이 있는 환자는 이 약을 복용하지 마십시오. 이 약을 복용하기 전에 만성 기관지염 등의 호흡곤란, 심질환, 고혈압, 갑상선기능질환, 당뇨병, 녹내장, 전립선 비대로 인한 배뇨곤란을 가진 환자는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 7일 이내에 증상의 개선이 나타나지 않거나 고열을 동반할 경우 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 복용 중 운전 및 기계조작 시 주의하십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

MAO 저해제, 진정제, 신경안정제와 함께 이 약을 복용하지 마십시오. 복용 중에는 음주하지 마십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

공포, 불안, 긴장, 진전, 쇠약, 창백, 호흡곤란, 배뇨곤란, 불면, 환각, 경련, 중추신경억제, 부정맥, 어지러움, 저혈압을 동반한 심혈관 허탈, 빈맥, 동계, 두통, 어지러움, 오심, 중등도의 진정작용, 구갈, 쇠약, 식욕부진, 구토, 신경과민, 다뇨증, 가슴앓이, 복시, 배뇨곤란, 드물게 피부염, 졸음, 흥분 등이 나타날 수 있습니다. 어지러움, 불면, 신경과민 등의 증상이 나타나면 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

