

용법용량

이 약은 적당한 분무기를 사용하여 투여해야 한다. 환자에게 도달되는 용량은 표시 용량의 40~60% 정도이며 사용하는 분무기에 따라 다르다. 분무시간과 용량은 유속, 분무기의 chamber, 충전용량에 따라 다르며 대부분의 분무기에 적당한 충전용량은 2~4ml이다.

1. 기관지 천식

1) 흡입 투여시작시 또는 심한 천식기간의 치료요법시 또는 경구 코티코스테로이드를 감량하거나 중단하고자 할 때의 용법은 다음과 같다.

- ① 성인 : 1회 1~2mg(2병~4병)을 1일 2회 투여
- ② 소아 : 1회 0.5~1mg(1병~2병)을 1일 2회 투여

2) 유지용량은 개인에 따라 다르며 가능한 최소용량으로 투여해야 한다.

권장되는 유지용량은 다음과 같다.

- ① 성인 : 1회 0.5~1mg(1병~2병)을 1일 2회 투여
- ② 소아 : 1회 0.25~0.5mg(1/2병~1병)을 1일 2회 투여

치료효과를 증진시키고자 하는 환자에게는 경구 코티코스테로이드제와의 병용요법보다는 일반적으로 이 약의 용량을 증가시키는 것이 전신적 부작용의 위험이 적으므로 더욱 바람직하다. 특히 기도의 점액분비가 없는 경우에는 경구 코티코스테로이드제를 투여하기 전에 이 약을 투여하는 것이 바람직하다.

2. 급성 후두 기관 기관지염

유소아에서 1일 1회, 1회 2mg을 투여한다.