# e약은요 정보

댄스탑외용액(케토코나졸)

주식회사제뉴원사이언스

공개일자 : 2021-01-29 / 수정일자 : 2021-01-29

"e약은요"는 일반소비자 눈높이에 맞춘 이해하기 쉬운 의약품 정보 제공을 위해 마련된 의약품개요정보입니다. 의약품에 관한 모든 내용을 담고 있지 않으며 자세한 사항은 식약처 의약품안전나라의 "의약품상세정보"를 참고하시기 바랍니다. 본 정보는 법적 효력을 가지는 것이 아닙니다.

## 이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 효모균에 의한 다음의 피부질환(비듬, 지루피부염, 어루러기)에 사용합니다.

## 이 약은 어떻게 사용합니까?

감염 부위(몸통, 얼굴, 두피, 머리카락)에 이 약을 바르고 일반 샴푸처럼 3~5분간 적용한 후에 헹구어 냅니다.

치료기간은 비듬 및 지루피부염 치료 시 1주 2회, 2~4주, 재발 방지 시 1~2주마다 1회 적용하고, 어루러기 치료시 1일 1회, 최대 5일, 재발방지 시 일광에 노출하기 전 단일 요법으로 1일 1회, 최대 3일간 적용합니다.

## 이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

## 이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 환자, 상처 또는 염증이 있는 두피 및 심한 미란(짓무름) 부위에는 이 약을 사용하지 마십시오.

이 약을 사용하기 전에 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부, 소아, 프로필렌글리콜에 과민증 환자 또는 경험자는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 외용으로만 사용하십시오.

이 약은 안과용으로 사용하지 않고, 눈에 닿지 않도록 주의하여 적용하며, 실수로 눈에 들어갔을 경우 충분한 양의 물로 완전히 씻어내십시오.

## 이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

동종의 항진균제(미코나졸, 에코나졸, 이소코나졸 등)와 함께 사용 시 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

적용부위에 화상, 결막염, 눈자극, 눈물흘림 증가, 탈모, 지각과민, 모낭염, 고름물집, 발진, 압통, 여드름, 탈모, 피부건조, 피부장애, 머릿결 이상, 머리카락 색 변화, 모낭염, 미각이상, 두드러기 등이 나타날 수 있습니다.

과민증상 및 자극감이 나타나는 경우 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.