

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료에 사용됩니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

만 12세 이상 및 성인은 1회 1캡슐씩, 1일 1회 복용합니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

만 6세 이하의 어린이가 과량 복용시 철분 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 환자, 12개월 미만의 영아, 혈색소증, 헤모시데린침착증, 철 이용 장애, 비철결핍성 빈혈, 철 과잉증, 감염이나 종양으로 인한 철결핍성빈혈, 만성 궤양, 간경변 환자, 갈락토오스 불내성, Lapp 유당분해효소 결핍증 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 등의 유전적인 문제가 있는 환자는 이 약을 복용하지 마십시오. 이 약을 복용하기 전에 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환, 심장 · 순환기계 기능 장애, 발작성 야간 혈색소뇨증, 신장애, 저단백혈증 환자는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 정해진 용법과 용량을 잘 지키십시오. 12세 이상 청소년에게 투여할 경우 보호자의 지도 감독하에 투여하십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 항생제, 제산제와 함께 복용하지 마십시오. 이 약을 복용하기 전에 철 함유제제(철분제, MRI용 간장 조영제 등), 항알도스테론제, 트리암테렌, 퀴놀론계, 페니실라민, 콜레스티라민, 궤장엑스 및 비타민 E와 같은 물질, 디포스포산 염류, 티록신, 세프디니르 제제, 200 mg 이상의 아스코르빈산(비타민 C)을 함께 복용 시 의사 또는 약사와 상의하십시오. 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차 및 우유 · 유제품은 복용 중, 복용 전후에는 피하십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

두드러기, 가려움, 햇빛 노출시 피부 과민반응, 복부 · 위통증, 위 경련, 위부불쾌감, 구토, 설사, 구역, 식욕부진, 변비, 흑변, 치아변색, 열, 혼수, 진단 또는 검사 시 AST, ALT의 상승, ALP 상승 등이 나타나는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.