

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 수술시 수술자 및 보건위생종사자의 손 소독에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

수술시 수술자 손소독에는 매일 사용전 손톱스틱으로 손톱아래를 깨끗이하여 깨끗하고 건조한 손과 손톱에 적용합니다. 펌프질하여 한손의 손바닥에 2 mL의 약을 받고, 다른 한손의 손가락으로 이 약을 손톱아래에 바릅니다. 남은 약으로 손과 팔꿈치까지 골고루 바르고, 다시 2 mL를 취해 다른 한손에 위와 동일한 조작을 합니다. 한번 더 2 mL를 취해 양손과 손목까지 이 약을 적용한 후 장갑을 착용하기 전까지 말립니다. 보건위생종사자의 손소독 시 깨끗하고 건조한 손과 손톱에 적용합니다. 펌프질을 하여 한 손의 손바닥에 2 mL의 약을 받습니다. 이후 손가락 사이 공간과 손톱아래에 특별히 신경을 쓰면서 손목까지 양손에 골고루 바른 다음 닦아내지 않고 말립니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 환자, 피부의 외피 이상보다 더 깊은 상처가 있는 경우, 임부 및 수유부는 이 약을 사용하지 마십시오. 천식 등 알레르기 질환 및 경험자, 상처난 피부(특히 화상)에 사용 시 의사 또는 약사와 상의하십시오. 삼키거나 주사하지 말고 반드시 외용으로만 사용하십시오. 뇌, 뇌막, 눈, 귀, 입, 점막(특히 생식기 점막)과 접촉해서는 안되며 고막천공이 있는 경우 청각관에 닿지 않도록 하십시오. 이 약을 사용한 손으로 절대로 눈을 만지지 마십시오. 눈에 접촉 시 각막 이식을 요할 수 있는 중대한 각막손상(각막미란, 상피결손/각막손상, 심각한 영구 시각장애)을 일으킬 수 있으므로 눈에 들어가지 않도록 주의하고, 만약 눈에 들어갔을 경우 즉시 깨끗한 물로 잘 씻어내십시오. 인화성 액체이므로 화상의 위험이 있으므로 전기기구 사용 전에 건조시키십시오. 다른 화학물질이나 세정제를 혼합하지 마십시오. 수술기구 소독에 사용하지 마십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

저해작용(불활성화)이 나타날 우려가 있으므로 이 약과 비누는 동시 또는 연속적인 사용을 피하십시오. 음이온성 유도체와 배합하지 마십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

자극, 감작성, 알러지반응 드물게 아나필락시스성 속 등이 나타나는 경우 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

실온에서 보관하십시오.