

용법용량

1. 첫 예방접종 (대상 : 영 · 유아시기의 기초접종에 대한 명확한 기억이 없거나, 면역 접종을 하지 않은 사람)

총 3 회 접종 실시

· 1차 접종 (7세 이상부터) 0.5ml

· 1차 접종 후 4~6주 경과 후 0.5ml

· 2차 접종 후 6~12 개월 경과 후 0.5ml

(주의 : 본 품은 영 · 유아에 대한 기초접종에 해당되지 않습니다.

즉, 영 · 유아시기의 표준접종은 소아용 DTaP를 접종하여야 합니다.)

2. 재접종 (대상 : 영 · 유아시절 기초접종을 일정대로 모두 접종한 사람)

· 만 10세~12세 사이 0.5ml

· 이후 매 10년 마다 0.5ml

3. 상처 발생시 파상풍 예방접종

a) 파상풍에 대한 과거 면역접종을 다 실시하고, 최근 접종이 다음과 같이 경과했을 경우

· 접종 후 5년까지 즉시 접종을 할 필요는 없다.

· 5~10년 경과시 0.5ml 접종

· 10년 이상 경과시 본 제 0.5ml + 250IU 파상풍 면역글로불린

b) 면역이 결핍되거나, 면역억제제 치료중인 환자는 백신접종의 예방효과가 불확실 할 수 있다. 이 경우 상처가 생겼을 때, 파상풍 면역글로불린을 동시에 접종한다.

※ 접종방법

혈관에 직접 투여하지 말 것

사용 전에 흔들어서 사용할 것

근육주사로서 접종할 것. 어떤 경우에는(예:출혈체질) 피하주사를 할 수도 있다.

