

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 퇴행성관절염(골관절염), 어깨관절주위염, 건·건초염(힘줄윤활막염), 건주위염, 상완골(위팔뼈)상과염(테니스 엘보우 등), 근육통, 외상후의 종창(부기)·동통(통증)의 진통·소염(항염)에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

약면의 박리지를 떼어낸 후 환부(질환부위)에 1일 1회 부착하여 사용하십시오.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 및 광과민증 또는 경험자, 아스피린 천식(비스테로이드성 소염(항염)진통제 등에 의한 천식발작의 유발) 또는 경험자, 티아프로펜산, 페노피브레이트, 베자피브레이트, 시프로피브레이트, 옥시벤존 과민증 또는 경험자, 임신기간 6개월 이상인 임부, 15세 미만의 소아는 이 약을 사용하지 마십시오. 이 약을 사용하기 전에 기관지 천식, 임부 또는 수유부, 의사의 치료를 받고 있는 환자는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 이 약을 사용 중이거나 사용 후 2주까지는 날씨에 관계없이, 옥외활동을 피하고, 일상 외출할 때에는 이 약의 도포(바른)부위를 옷, 선글라스, 모자, 자외선 차단제 등으로 가려 자외선에 노출되지 않도록 하십시오. 흰색이나 얇은 옷은 자외선을 투과시킬 수 있으므로 유색 옷을 착용하십시오. 눈 및 점막, 무좀, 백선 등에는 사용하지 마십시오. 손상된 피부 및 점막, 습진 또는 발진 부위에 사용하는 경우 일시적인 자극 및 날카로운 통증을 일으킬 수 있으므로 사용 시 주의하십시오. 밀봉봉대법을 사용하지 마십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

드물게 쇼크, 아나필락시양 증상(두드러기, 호흡곤란, 얼굴부기 등 과민성유사증상), 건성 수포음(거품소리), 천명(숨을 쉴때 거름), 호흡곤란 등의 증상이 나타나는 경우 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 때때로 발적(충혈되어 붉어짐), 발진, 가려움, 수포, 짓무름, 자극감 및 종창(부기) 등의 접촉피부염, 피부건조, 색소침착, 직사일광(자외선)에 의해 광과민증 등의 증상이 나타날 수 있으며 증상이 심한 경우 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 1주일 정도 사용하고도 증상개선이 보이지 않을 경우 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.