

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 금연보조제로서 니코틴의존증에 있어 니코틴금단증상의 완화에 사용됩니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

성인 및 고령자(노인)는 흡연충동을 느낄 때, 이 약 1정을 입안에 넣고 씹거나 삼키지 않고 천천히 빨아서 복용합니다. 초기에는 이 약 1정을 매 1~2시간 간격으로 복용합니다. 통상 1일 8~12정을 복용하며 1일 최대 25정 이상을 넘지 않도록 합니다. 이 약은 다음과 같은 순서로 복용합니다. 이 약 1정을 입안에 넣고 강한 맛이 느껴질 때까지 빨니다. 이후 잇몸과 볼 사이에 두었다가 맛이 약해지면 다시 같은 방법으로 반복해서 완전히 녹을 때까지 빨도록 합니다. 치료기간은 최소 3개월이며 3개월 후부터는 단계적으로 복용량을 줄이도록 하고 이 약 복용량이 1일 1~2정으로 감소되었을 때 치료를 중단하도록 합니다. 일반적으로 이 약과 같은 니코틴 대체요법제는 6개월 이상의 사용은 권장되지 않습니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 환자, 불안정 협심증 또는 협심증 악화, 최근 3개월 이내에 심근경색을 경험한 환자, 급성경색 증후기 환자, 중증 심부정맥 환자 등 임상적으로 관련이 있는 심부정맥 환자, 전신 고혈압 또는 말초혈관질환 등 중증(심한 증상)의 심혈관계 질환 환자, 급성뇌졸중, 최근 뇌혈관성질환이 있는 환자, 임부, 수유부, 18세 미만의 소아 및 청소년, 비흡연자 및 일시적 흡연자는 이 약을 사용하지 마십시오. 이 약을 사용하기 전에 활동성식도염, 구강(입안) 및 인두염, 위염, 소화성궤양, 폐색(단혀서 막힘)성동맥질환, 안정형협심증, 심부전, 비대상성심부전, 심근경색, 심부정맥, 혈관경련, 조절되지 않는 고혈압, 동맥혈관 바이패스이식 또는 혈관성형술 환자 등 심혈관계 질환, 고령자(노인), 신장·간기능상실 환자, 당뇨병, 갑상선기능항진증 또는 크롬친화세포종 환자, 항경련 치료를 받고 있거나 뇌전증 경험자는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

파라세타몰, 카페인, 이미프라민, 옥사제팜, 펜타조신, 프로프라놀롤, 테오필린, 와파린, 에스트로겐, 리그노카인, 페나세틴, 인슐린, 아드레날린성 길항제(프라조신, 라베탈롤 등), 플레카이니드, 아드레날린성 효능제(이소프레날린, 페닐레프린), 프로폭시펜, 푸로세미드 이노제, H2길항제, 베타차단제, 테오필린, 타크린, 클로자핀, 로피니롤과 함께 사용 시 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

불면, 어지러움, 두통, 떨림, 구역, 구토, 소화불량, 상복부 통증, 설사, 변비, 복부팽만, 딸국질, 위염, 구강(입안)건조, 구내염, 식도염, 입안 불편감, 삼킴곤란, 트림, 침과다분비, 인두염, 기침, 인후통(목구멍 통증), 호흡곤란, 심계항진(두근거림), 심방성 부정맥, 빈맥(빠른맥), 과민증, 혈관신경성부종, 두드러기, 궤양성 구내(입안)염, 아나필락시스, 무력증, 피로, 권태감, 인플루엔자 유사 질병 등이 나타나는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 때때로 치료 초기에 가벼운 인후(목구멍)자극, 타액(침)분비증가, 딸국질, 소화불량 또는 속쓰림 등이 나타날 수 있습니다.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

습기와 빛을 피해 25℃ 이하에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.