

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 육체피로, 임신 · 수유기, 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시, 노년기의 비타민 A, C, E의 보급과 눈의 건조감의 완화, 야맹증, 말초혈행장애 및 갱년기 시 어깨 · 목결림, 수족저림 · 수족냉증(손발이 차가움) 증상의 완화와 아연의 보급에 사용됩니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

성인은 1일 1회 1~2정을 복용합니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

비타민 A를 1일 5,000 IU 이상 복용 시 선천성 기형을 일으킬 수 있습니다. 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성은 복용하지 마십시오.

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약 또는 황색5호에 과민증 환자, 만 12개월 미만의 젖먹이, 윌슨병, 갈락토오스 불내성, Lapp 유당분해효소 결핍증 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 등의 유전적인 문제가 있는 환자는 이 약을 복용하지 마십시오. 이 약을 복용하기 전에 고옥살산뇨증 환자(뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태), 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아, 심장 · 순환기계기능 장애, 신장장애, 저단백혈증, 담낭(쓸개) 관련 질환, 간질환, 통풍 또는 신장결석 환자는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 정해진 용법과 용량을 잘 지킵시오. 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다. 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제와 함께 복용하지 마십시오. 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제, 항알도스테론제, 트리암테렌과 함께 복용 시 의사 또는 약사와 상의하십시오. 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피하십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종, 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 설사, 상복부 통증, 혼수, 위장관장애, 소화장애, 저혈압, 폐부종, 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아지거나 출혈이 오래 지속되는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.