용법용량

1. 투여 일정 및 용량

1) 생후 12개월 ~ 만 12세 소아: 1회 0.5 mL를 근육 또는 피하주사한다.

2차 접종을 실시할 경우, 2차 접종은 1차 접종일로부터 최소 3개월 이후에 접종한다.

2) 청소년/성인(만 13세 이상): 1회 0.5 mL를 근육 또는 피하주사로 1차 접종하고 4~8주 동량을 2차 접종한다.

2. 투여 방법

1) 이 백신은 근육 또는 피하주사한다.

2) 상완 외측(삼각근)에 접종하는 것이 권장되며, 정맥투여해서는 안된다.

3) 혈소판감소증 또는 응고 장애가 있는 자는 피하주사 해야한다.

4) 백신을 용해하기 위하여 첨부용제 0.7 mL를 주사기에 취하여 동결건조된 백신이 들어있는 바이알에 넣고 완전히 혼화되도록 흔든다. 용해액 전량을 주사기에 취하여 상완 외측 또는 전외측 대퇴부에 전량을(약 0.5 mL) 근육 또는 피하주사한다. 역가 손실을 최소화하기 위하여 첨부용제로 용해한 후 즉시 백신을 투여하고 용해 후 30분 이내 사용하지 않은 백신은 폐기하여야 한다.