

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 남성형 탈모증(안드로젠탈모증) 및 여성형 탈모증(안드로젠탈모증)의 치료에 사용됩니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 이 약 0.5~1 mL를 1일 2회(아침, 저녁), 최소 4개월 동안, 환부에만 바릅니다. 하루 총 투여량이 2 mL를 초과하지 마십시오. 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있습니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 환자, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부, 18세 미만, 심혈관계 질환(관상동맥 질환, 부정맥, 울혈심부전, 심장판막 질환, 치료받거나 혹은 치료받지 않은 고혈압, 저혈압), 유전적 요인이 없는 탈모, 갑작스런 부분적 탈모, 두피의 이상(홍반, 염증, 감염, 자극 또는 통증, 건선, 일광화상), 원인 불명의 탈모, 두피를 면도한 환자, 출산과 관련된 탈모 환자는 이 약을 사용하지 마십시오. 이 약을 사용하기 전에 고령자는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 이 약의 사용을 잊은 경우에도 용량을 보충하지 않고 그대로 다음 용량을 적용하십시오. 이 약은 외용으로만 사용하고 두피 이외의 부위에는 사용하지 마십시오. 밀봉봉대를 사용하지 마십시오. 이 약 사용으로 눈의 화상 및 자극이 나타날 수 있으므로 눈에 들어가지 않도록 주의하고 눈, 벗겨진 피부 및 점막 등 민감한 부위에 이 약이 닿으면 즉시 깨끗한 물로 씻어내십시오. 이 약을 사용한 후에는 손을 깨끗이 씻으십시오. 헤어스타일링제는 이 약이 마른 후 사용하고, 저녁에 사용할 때는 이 약의 건조를 위해 취침 2~4시간 전에 사용하십시오. 두피에서 공기가 순환되면 이 약의 효과가 감소될 수 있으므로, 이 약의 건조를 촉진시키기 위해 헤어드라이어를 사용하지 마십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

다른 두피용 약물, 외용 코르티코이드, 레티노이드, 바셀린, 디트라놀 또는 경피흡수 촉진 약물과 함께 사용하지 마십시오. 혈관확장제(구아네티딘 등)와 함께 사용시 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

가려움, 인설, 홍반, 발적, 피부염, 피부건조, 이 약을 바른 부위 이외의 다모증(여성의 경우 안면털 성장), 모낭염, 작열감 및 피진을 포함한 국소 자극, 박리, 탈모, 피부 농양, 여드름, 조갑장애, 지루, 습진, 모발이상, 때때로 설사, 구역, 구토, 흉통, 혈압변화, 맥박변화, 심계항진, 심박동의 증가, 심낭삼출, 심막염, 전색, 빈맥, 기

존에 존재하던 협심증의 악화 또는 진단받지 않은 관상동맥질환자에서 협심증의 유발, 기관지염, 상기도 감염증, 부비동염, 호흡곤란, 호흡의 단축, 골절, 배통, 건염, 동통, 신경염(다발성 신경염 등), 쇠약, 어지럼, 두통, 몽롱함, 실신, 간염, 부종, 신결석, 염 및 체액저류, 열, 두드러기, 알레르기비염, 전신성 홍반 및 안면부종, 오한, 안구자극, 쓴맛, 이염(특히 외이염), 미각변화, 시력장애, 발기부전, 찌르는 것 같은 아픔, 갑작스러운 원인 불명의 체중증가 등이 나타나는 경우 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 화기 근처에 두지 마십시오.