

사용상의주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것

30개월 이하의 유아

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로, 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것

- 1) 이 약은 점안용으로만 사용한다.
- 2) 이 약은 과도하게 사용하면 오히려 충혈을 일으킬 수 있으므로 정해진 용법, 용량을 잘 지킨다.
- 3) 소프트콘택트렌즈의 장착액으로 또한 소프트콘택트렌즈를 착용한 채 사용하지 않는다.
- 4) 용기의 끝이 눈꺼풀 및 속눈썹에 닿으면 눈곱이나 진균등에 의해 약액이 오염 또는 혼탁될 수 있으므로 주의한다. 또한 혼탁된 것은 사용하지 않는다.
- 5) 오염을 방지하기 위해 가능한 공동으로 사용하지 않는다.
- 6) 사용기한을 초과한 것은 투여하지 않고 일단 개봉한 것은 가능한 빨리 사용한다.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 눈의 통증이 심한 환자
- 2) 지금까지 안약에 의한 알레르기(예를 들어 눈의 충혈, 가려움, 부종, 발진, 발적 등) 증상을 일으킨 적이 있는 환자본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
- 3) 녹내장 환자
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 5) 소아 : 경련을 유발할 수 있다.
- 6) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도, 감독하에 투여한다.

5. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의해 눈의 충혈, 가려움, 부종 및 피부의 발진, 발적, 가려움 등의 증상이 나타날 경우
- 2) 눈의 침침함이 개선되지 않는 경우
- 3) 5~6일간 투여 후에도 증상의 개선이 보이지 않는 경우

6. 기타

- 1) 잘못하여 의복 등에 착색된 경우에는 물로 세척하여 제거한다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.
- 4) 사용기한(외곽의 밑면에 기재)을 초과한 제품은 사용하지 않고 일단 개봉한 것은 가능한 빨리 사용한다.