

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 알러지성 결막염에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

성인은 1회 1방울씩, 1일 2~4회 또는 상태에 따라 적절히 점안합니다. 유.소아는 의사의 처방에 따릅니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 환자, 1세 미만의 소아는 이 약을 사용하지 마십시오. 이 약을 사용하기 전에 탈감작요법 등 알레르기 치료를 받고 있는 사람, 약물 등에 의한 알레르기 반응 경험자, 가려움을 동반한 눈의 통증 환자, 알레르기에 의한 증상인지는 분명하지 않은 사람, 임부 또는 수유부는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 점안 후 시야가 흐려지는 것을 경험한 사람은 시야가 뚜렷해질 때까지 운전이나 기계조작을 하지 마십시오. 드물게 졸음이나 진정작용이 나타날 수 있으므로 운전 및 기계조작 시 주의하십시오. 1주 정도 사용하여도 증상의 개선이 없을 경우 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 정해진 용법과 용량을 잘 지키십시오. 이 약은 점안용으로만 사용하십시오. 용기의 끝이 눈꺼풀 및 속눈썹에 닿으면 눈곱이나 곰팡이 등에 의해 약액이 오염 또는 혼탁될 수 있으므로 주의하고 혼탁된 것은 사용하지 마십시오. 오염을 방지하기 위해 될 수 있는 한 공동으로 사용하지 마십시오. 이 약을 다른 점안제와 함께 사용할 경우에는 적어도 5분 이상 시간차를 두고 투여하십시오. 소프트 렌즈를 착용한 상태에서 사용하지 마시고 투여 후 적어도 15분이 경과한 후에 렌즈를 착용하십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

눈의 충혈, 자극감, 가려움의 지속, 눈꺼풀염, 눈꺼풀피부염, 눈의 흐림 등이 나타나는 경우 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 일시적인 화끈감, 충혈, 부종, 가려움증과 같은 국소자극이 나타날 수 있습니다.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

15~25도에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 개봉 후 4주가 지나면 사용하지
마십시오.