

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 두통, 치통, 발치(이를 뽑음)후 동통(통증), 인후(목구멍)통, 귀의 통증, 관절통, 신경통, 요(허리)통, 근육통, 건통(어깨통증), 타박통, 골절통, 염좌통(뻘 통증), 생리통, 외상(상처)통의 진통, 오한, 발열시의 해열에 사용됩니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

15세 이상은 1회 2정 1일 3회 공복(빈 속)을 피하여 복용하며 복용간격은 4시간 이상이 되도록 합니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

매일 세 잔 이상 정기적 음주자가 이 약 또는 다른 해열진통제를 복용할 때는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 위장출혈을 일으킬 수 있습니다. 이 약 복용시 치명적일 수 있는 중대한 심혈관계 혈전 반응, 심근경색증, 뇌졸중의 위험이 증가하며, 위장관 출혈, 궤양 및 천공 등 심각한 위장관계 이상반응이 나타날 수 있습니다.

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 환자, 아스피린이나 다른 비스테로이드성 소염진통제(COX-2 저해제 포함)에 대하여 천식, 두드러기, 알레르기 반응 또는 경험자, 소화성궤양, 심한 혈액이상, 기관지 천식 또는 경험자, 관상동맥(심장동맥)우회로술(CABG) 전후에 발생하는 통증, 15세 미만의 소아는 이 약을 복용하지 마십시오. 이 약을 복용하기 전에 소화성궤양 경험자, 간장애 또는 경험자, 신장장애 또는 경험자, 심기능부전, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부, 고령자, 심근경색이나 뇌졸중 예방목적으로 저용량 아스피린을 복용하는 사람은 의사 또는 약사와 상의하십시오. 정해진 용법과 용량을 잘 지키십시오. 5~6회 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

다른 해열진통제, 감기약, 진정제, 멀미약과 함께 복용하지 마십시오. 프로베네시드, 설핀피라존, 디곡신, 페니토인, 바크로펜, 이노제, 항고혈압제, ACE 저해제(억제제), 푸로세미드, 아스피린, 리튬, 메토크레이트, 경구용 항응혈제(와파린 등)를 함께 복용 시 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

구역, 복부팽만감, 위통, 가슴앓이, 식욕부진, 설사, 변비, 구토, 위염, 잠재성출혈과다, 드물게 출혈을 동반한 소화기계의 궤양, 때때로 중추신경 이상반응, 두통, 우울, 현기증, 불면, 공포, 의식장애, 이명(귀울림), 난청,

약시, 드물게 두드러기, 자반, 가려움증, 발진, 매우 드물게 피부점막안증후군(스티븐스-존슨증후군), 광민감 반응(빈도불명), 다형성 홍반, 탈락 피부염, 독성표피괴사용해(리엘증후군) 및 빈도불명의 호산구 증가 및 전신 증후군을 동반한 약물 발진(DRESS 증후군)과 급성전신발진고름물집증, 드물게 황달, GOT, GPT, ALP의 상승, 드물게 재생불량성빈혈, 용혈성빈혈, 자가면역 출혈성빈혈, 출혈, 과립구감소, 혈소판감소, 혈소판기능 저하(출혈시간 연장), 드물게 급성신부전, 핏뇨(소변감소), 혈뇨 등의 증상 및 요단백, BUN, 혈중크레아티닌의 상승, 고칼륨혈증, 전신부종, 코니스 증후군 등이 나타나는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.