

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 일시적 불면증의 완화에 사용됩니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

성인은 1회 1캡슐(50 mg)씩, 1일 1회 취침 전에 복용합니다. 개인에 따라 1캡슐(50 mg) 복용 시 과도한 진정작용이 나타날 경우 ¹/2캡슐(25 mg)을 취침 전에 복용합니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 환자, 천식발작, 폐기종, 만성기관지염에 의한 호흡곤란, 녹내장, 하부 요로 폐색성 질환(전립선비대 등), 협착성 소화성 궤양, 유문십이지장 폐색 환자, 15세 미만의 소아, 경련성 질환(뇌전증 등), 크롬친화성세포종 환자, 수유부, 일상적으로 불면이거나 불면증 진단을 받은 환자는 이 약을 복용하지 마십시오. 이 약을 복용하기 전에 중증 근무력증, 고령자, 알레르기 체질, 약에 의한 알레르기 증상 경험자, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성은 의사 또는 약사와 상의하십시오. 이 약 복용 후 졸음이 나타날 수 있으므로 운전 및 기계조작 시 주의하십시오. 정해진 용법과 용량을 잘 지키십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

이 약과 동일한 성분을 함유한 다른 제제, 다른 최면진정제, MAO 억제제, 감기약, 해열진통제, 진해거담제, 항히스타민제를 함유하고 있는 내복약(비염용 내복약, 멀미약, 알러지용약)과 함께 복용하지 마십시오. 복용 중에는 음주하지 마십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

발진, 발적, 가려움, 구갈, 위통, 오심·구토, 식욕부진, 설사, 어지러움, 두통, 기상시의 두중감, 활동중의 졸음, 불쾌감, 신경과민, 일시적인 의식장애(주의력의 저하, 잠이 덜깨는 증상, 판단력의 저하, 말·행동의 이상 등), 두근거림, 권태감, 배뇨곤란, 시야혼란, 폐쇄각 녹내장 등이 나타나는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.