

사용상의주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 사람
- 2) 12세 미만 소아

2. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 위통, 구토 등 위장관 불쾌감과 발한, 빈맥, 가려움, 두드러기, 두통, 어지럼, 홍조
- 2) 두부이외의 신체부위에서 발모현상이 나타는 경우
- 3) 정해진 용법·용량대로 3 ~ 4개월 사용 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우
- 4) 증상이 지속되거나 기대하는 효과가 나타나지 않는 경우

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 설폰아미드 제제와 동시 복용 시 주의할 것.
- 2) 흉터로 인한 탈모나 안드로겐 유전성 탈모증, 남성형 대머리에는 사용하지 말 것.
- 3) 이 약은 당뇨병환자에 복용할 수도 있다.
- 4) 평균 치료 기간은 3 ~ 6개월이다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 사용기한이 초과된 것은 복용하지 말 것.
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.