

## e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 급성 상기도 감염으로 인한 발열 시 해열에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

생후 6개월 이상의 소아는 1회 0.4~0.6 mL/kg(5~7 mg/kg), 4~6시간 간격으로 필요시에 복용하며, 1일 최대 4회(28 mg/kg)를 넘지 않습니다. 연령대별 권장용량은 허가사항을 참고하십시오.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

매일 세 잔 이상 정기적 음주자가 이 약 또는 다른 해열진통제를 복용할 때는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 위장출혈을 일으킬 수 있습니다. 이 약 복용시 치명적일 수 있는 중대한 심혈관계 혈전 반응, 심근경색증, 뇌졸중의 위험이 증가하며, 위장관 출혈, 궤양 및 천공 등 심각한 위장관계 이상반응이 나타날 수 있습니다.

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 환자, 소화성궤양, 심한 혈액이상, 간장애, 신장애, 심부전, 고혈압 환자, 기관지천식, 아스피린 또는 다른 소염진통제에 의한 천식, 두드러기, 알레르기 환자 또는 경험자, 심장동맥 우회로술 전후 통증 치료 환자, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부는 이 약을 복용하지 마십시오. 이 약을 복용하기 전에 과민증, 소화성 궤양, 혈액이상, 출혈경향, 간장애, 신장애, 심기능부전, 고혈압, 전신성홍반성루푸스, 혼합결합조직질환, 궤양성대장염, 위암, 크론병 환자, 노인, 소아, 심근경색이나 뇌졸중 예방목적으로 저용량 아스피린을 복용하는 사람은 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

다른 비스테로이드성 소염진통제, 아스피린, 고용량의 메토틱세이트와 함께 복용하지 마십시오. 글루코코르티코이드, 알코올, 디곡신, 페니토인, 프로베네시드, 설핀피라존, 설폰닐우레아제, 이노제와 항고혈압제 병용, ACE 억제제, 푸로세미드, 리튬, 저용량의 메토틱세이트, 쿠마린계 항응고제(와파린 등)와 함께 복용 시 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

드물게 속(홍내고민, 오한, 호흡곤란, 혈압저하), 재생불량성빈혈, 용혈성빈혈, 무과립구증, 과립구감소, 백혈구감소, 혈소판감소, 혈소판 기능 저하(출혈시간 연장), 호산구증가, 소화성궤양 위장출혈, 천공, 궤양성대장염, 혈변, 위염, 궤장염, 피부점막안증후군(스티븐스-존슨증후군) 및 독성표피괴사증후군(리엘증후군), 빈도불

명의 호산구 증가 및 전신 증후군을 동반한 약물 발진(DRESS 증후군), 급성전신발진고름물집증, 천식발작의 유발, 두드러기, 습진, 자반, 때때로 발진, 가려움증, 드물게 앞이 보이지 않음, 암침 등의 시각장애, 무균성수막염, 급성신부전, 췌노, 혈뇨, 뇨단백, BUN, 혈중 크레아티닌의 상승, 고칼륨혈증 등이 나타나는 경우 즉각 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 때때로 식욕부진, 구역, 구토, 복통, 소화불량, 설사, 위부불쾌감, 안와주위부종, 드물게 황달, GOT, GPT, ALP 상승, 난청, 이명, 미각이상, 혈압저하, 혈압상승, 심계항진, 요량감소, 전신부종 및 이에 수반한 숨가쁨, 나른함, 급성 폐부종, 매우 드물게 구갈, 구내염, 복부팽만감, 변비, 권태감, 발열, 비출혈, 빈도불명의 코니스 증후군(관상동맥 수축과 관련이 있는 알레르기 또는 과민증 후 발생하는 심혈관계 증상) 등이 나타나는 경우 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

빛을 피해 상온(15~25 ℃)에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.