

# e약은요 정보

니코레트인비지패취(니코틴)

한국존슨앤드존슨판매(유)

공개일자 : 2020-12-24 / 수정일자 : 2020-12-24

"e약은요"는 일반소비자 눈높이에 맞춘 이해하기 쉬운 의약품 정보 제공을 위해 마련된 의약품개요정보입니다. 의약품에 관한 모든 내용을 담고 있지 않으며 자세한 사항은 식약처 의약품안전나라의 "의약품상세정보"를 참고하시기 바랍니다. 본 정보는 법적 효력을 가지는 것이 아닙니다.

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 금연시 보조 요법제로 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

매일 아침에 일어나자마자 패취 1매를 부착하고 취침 시에 떼어냅니다.

깨끗하게 씻은 손으로 패취의 박리지 한쪽을 떼어내고 텸이 없는 피부의 건조하고 손상되지 않은 부위 (엉덩이, 상완, 가슴 등)에 부착하고 나머지 박리지를 떼어내어 완전히 부착합니다.

권장용량과 권장기간은 허가사항을 참고하십시오.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약 사용 중에 담배를 계속 피우면 니코틴에 의하여 심혈관 부작용이 더 자주, 더 뚜렷하게 나타날 수 있으므로 완전히 금연한 환자만 사용하십시오.

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 환자, 만성피부질환(건선, 만성피부염, 두드러기), 전신적인 피부질환, 과민성피부염, 불안정 협심증, 협심증 악화, 최근 3개월 이내에 심근경색을 경험한 환자, 급성 경색증 후기, 중증의 심부정맥, 전신 고혈압, 말초혈관질환, 뇌혈관질환(급성 뇌졸중, 뇌혈관 이상), 임부 및 수유부, 18세 미만의 소아 및 청소년, 비흡연자 및 일시적 흡연자는 이 약을 사용하지 마십시오.

이 약을 사용하기 전에 위염, 소화성궤양, 폐색성 동맥질환, 안정형 협심증, 심부전, 비대상성 심부전, 심근경색, 심부정맥, 혈관경련, 조절되지 않는 고혈압, 동맥혈관 바이패스 이식 또는 혈관성형술 환자, 신부전, 간부전, 당뇨병, 갑상선기능항진증, 크롬친화세포종 환자는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

파라세타몰, 카페인, 이미프라민, 옥사제팜, 펜타조신, 프로프라놀롤, 테오필린, 와파린, 에스트로겐, 리그노카인, 페나세틴, 인슐린, 아드레날린성 길항제(프라조신, 라베탈롤 등), 플레카이니드, 아드레날린성 효능제(이소프레날린, 페닐레프린), 프로폭시펜, 푸로세미드 이뇨제, H2길항제, 베타차단제, 테오필린, 타크린, 클로자핀, 로피니롤과 함께 사용 시 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

홍반(붉은 반점), 작열감(화끈감), 수포, 피부 발진 또는 적용 부위의 조임, 초조, 불안, 신경과민, 불면, 비정상적 꿈, 두통, 어지러움, 운동이상, 주의력장애, 기면(졸음), 정서불안, 과민, 우울, 혼돈상태, 진전(떨림), 두근거림, 고혈압, 홍조, 가슴 통증, 호흡곤란, 부정맥, 기침, 상기도감염, 오심(구역), 복통(배아픔), 소화불량, 구토, 변비, 설사, 복부(배부분)팽만, 구강(입안) 건조, 적용부위 피부반응, 다한증(땀과다증), 피부 탈색, 경피혈관염, 적용부위 통증 및 불쾌감, 근육통, 관절염, 무력증, 관절통, 근 경축(경련과 수축이 일어나 수축상태가 지속되는 현상), 요통(허리통증), 두드러기, 발진, 가려움증, 혈관부종(부기), 아나필락시스양반응 등이 나타나는 경우 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

습기와 빛을 피해 25°C 이하에서 보관하십시오.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.