

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시, 노년기의 비타민 A, C, B1, E의 보급과 눈의 건조감의 완화, 야맹증(밤에 잘 못 보는 증상), 햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화, 잇몸 출혈·비출혈(코피) 예방, 말초혈행장애 및 갱년기 시 어깨·목결림, 수족(손발) 저림·수족냉증(손발이 차가움) 증상의 완화에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

12세 이상 및 성인 1회 1캡슐씩, 1일 1회 복용합니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

비타민 A를 1일 5,000 IU 이상 복용 시 선천성 기형을 일으킬 수 있습니다. 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성은 복용하지 마십시오.

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 환자, 만 12개월 미만의 젖먹이, 대두유 또는 콩 또는 땅콩에 과민증 환자는 이 약을 복용하지 마십시오. 이 약을 복용하기 전에, 고옥살산뇨증(요 중에 과량의 수산염이 배설되는 상태), 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아, 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환, 심장·순환기계기능장애, 신장장애, 저단백혈증, 통풍, 신장결석, 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자, 혈전성 소인이 있는 환자, 황색5호 과민증 환자는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 정해진 용법과 용량을 잘 지키십시오. 각종 요검사 시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제와 함께 복용하지 마십시오. 에스트로겐을 포함한 경구(먹는)용 피임제, 항알도스테론제, 트리암테렌, 정주용 지질제와 함께 복용 시 의사 또는 약사와 상의하십시오. 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피하십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부기, 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 묽은변, 구내염(입안염), 피부염, 땀 · 호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종, 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아지거나, 출혈이 오래 지속되는 증상이 나타나는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오.어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.