e약은요 정보

디나펜플라스타(디클로페낙나트륨)

현대약품(주)

공개일자 : 2021-01-29 / 수정일자 : 2021-01-29

"e약은요"는 일반소비자 눈높이에 맞춘 이해하기 쉬운 의약품 정보 제공을 위해 마련된 의약품개요정보입니다. 의약품에 관한 모든 내용을 담고 있지 않으며 자세한 사항은 식약처 의약품안전나라의 "의약품상세정보"를 참고하시기 바랍니다. 본 정보는 법적 효력을 가지는 것이 아닙니다.

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 퇴행성 관절염(골관절염), 어깨관절 주위염, 힘줄 및 힘줄윤활막염, 힘줄주위염, 위팔뼈상과염(테니스엘보 등), 근육통(근, 근막성 요(허리)통증 등), 외상(상처) 후 부기 및 통증의 진통, 소염(항염)에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

성인 (15세 이상)은 1일 1회 1매를 환부(질환 부위)에 붙입니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 경험자, 아스피린 또는 기타의 비스테로이드 소염제에 천식 또는 경험자, 아스피린 또는 기타의 비스테로이드 소염제에 과민증 환자, 만 15세 미만의 어린이, 눈 및 점막, 손상된 피부, 습진 또는 발진이 난 부위에는 이 약을 사용하지 마십시오.

이 약을 사용하기 전에 기관지 천식 환자, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부, 고령자, 감염을 동반한 염증, 만성질환(퇴행성관절염(골관절염) 등)에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

밀봉붕대법으로 사용하지 마십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

이 약을 사용하는 동안 다른 디클로페낙 제제, 비스테로이드 소염제를 함께 사용하지 마십시오.

뉴퀴놀론계 항균제(에녹사신 등)와 함께 복용(사용)시 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

광선과민반응, 부종(부기), 피부박탈, 습진, 피부건조, 때때로 피부염, 가려움, 충혈되어 붉어짐, 거칠어짐, 자극감, 드물게 수포형성, 색소침착, 접촉피부염, 매우 드물게 과민반응, 혈관신경부종(부기), 천식 등이 나타나는 경우 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.