용법용량

1. 천식

1) 성인 및 12세 이상의 청소년

플루티카손푸로에이트 $100 \mu g$ + 빌란테롤 $25 \mu g$ 을 1일 1회 흡입하거나 또는 플루티카손푸로에이트 $200 \mu g$ + 빌란테롤 $25 \mu g$ 을 1일 1회 흡입한다.

이 약 흡입 시, 환자는 대개 15분 내에 폐 기능 개선을 경험한다. 그러나 천식 증상 조절을 유지하기 위해서는 매일 규칙적으로 사용하고, 증상이 없을 시에도 지속적으로 사용해야 한다. 이 약의 투여 기간 동안 증상이 발생하면, 즉각적인 완화를 위해 흡입용 속효성 베타2-효능약을 사용해야 한다.

저용량 및 중간 용량의 흡입용 코르티코스테로이드와 지속성 베타2-효능약과의 병용을 필요로 하는 성인 및 12세 이상의 청소년에서는 이 약의 시작용량으로 100/25 //g이 권장된다. 만약 환자가 이 약 100/25 //g으로 적절히 조절되지 않는 경우, 200/25 //g으로 용량을 증가할 수 있다.

환자는 정기적으로 의사의 진단을 받아 최적의 용량을 유지할 수 있도록 해야 하며 의학적 조언 없이 환자 임의로 용량을 변경하지 않도록 한다. 투여량은 천식 증상을 효과적으로 조절할 수 있는 최저용량으로 한다.

고용량의 흡입용 코르티코스테로이드와 지속성 베타2-효능약과의 병용을 필요로 하는 성인 및 12세 이상 청소년에서는 이 약 200/25 / g이 권장된다.

- 이 약의 최대 권장 용량은 1일 1회 200/25 µg이다.
- 2) 12세 미만 소아

12세 미만 소아의 천식 치료에 대한 이 약의 안전성 · 유효성은 확립되지 않았다.

2. 고령자(> 65세)

용량 조절이 필요하지 않다.

3. 신장애 환자

용량 조절이 필요하지 않다.

4. 간장애 환자

경증, 중등도 및 중증의 간장애 환자에서는 플루티카손푸로에이트의 전신 노출(Cmax 및 AUC)이 증가하였다. 간장애 환자는 코르티코스테로이드 관련 전신 이상 반응의 위험이 증가할 수 있으므로 간장애 환자에게 투여 시 주의를 기울여야 한다. 중등도 또는 중증의 간장애 환자에서 최대 용량은 1일 1회 100/25 세 이다.