

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 위산과다, 속쓰림, 신트림에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

성인(15세~79세)은 1회 1정(75 mg)씩, 1일 1회 복용합니다. 8시간 경과후에도 증상의 개선이 없을 경우 1정(75 mg)을 추가로 복용합니다. 1일 2정(150 mg)을 초과하지 마십시오.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약 또는 다른 H₂ 수용체 길항제에 과민증 환자, 빈혈, 혈소판 감소, 백혈구 감소, 혈액질환, 간/신질환, 위·십이지장질환, 천식·류마티스, 15세 미만의 어린이, 80세 이상의 고령자, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부, 갈락토오스 불내성, Lapp 유당분해효소 결핍증 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 등의 유전적인 문제가 있는 환자는 이 약을 복용하지 마십시오. 이 약을 복용하기 전에 약물과민반응의 경험자, 알레르기 체질, 65세 이상의 고령자, 목의 통증, 기침 또는 고열, 원인 불명의 체중감소, 지속적인 복통, 황색 4호·타르트라진 과민증 환자 또는 알레르기 반응 경험자, 중증의 간 또는 신기능이 손상된 환자는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 정해진 용법과 용량을 잘 지키십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

이 약을 복용하는 동안 다른 위장약, 스테로이드제, 항생물질, 항암제, 아졸계 항진균제, 고용량(3,900 mg)의 아스피린, 게피티니브, 프룰리플록사신 또는 아타나자비어를 복용하지 마십시오. 복용 중에는 음주하지 마십시오. 카페인, 초콜릿, 튀긴 음식을 복용 중에는 피하십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

드물게 발진, 가려움, 기관지천식, 후두부종(후두부기), 혈압저하, 기관지경련, 인두부종(인두부기), 호흡곤란, 아나필락시스(과민성)모양 증상, 빈혈, 범(전체)혈구감소증, 무과립구증, 과립구감소 때때로 백혈구감소, 호중구증가, 드물게 혈소판감소 자색반(자주색반점), 호산구증가, (치명적)혈소판감소증, 때때로 변비, 설사, 구갈(목마름), 구역, 드물게 복부팽만감 등의 위장장애, ALT, AST, ALP, γ-GTP 상승 등의 간기능장애, 황달, 섬망, 방향감각장애, 가역적인 정신착란, 두통, 졸음, 어지럼, 무력증, 저림, 단기간의 무증상 심실성 빈맥, 여

성형유방증, 발한(땀이 남), 두드러기, 발진, 박탈성 피부염, 통풍 또는 신석증과는 관련없는 고요산혈증(요산 과다증), 발열, 흉통(가슴통증), 근육통, 비염(코염), 인두염, 기침, 혈관염, 관절통, 혈청병, 얼굴부기, 유즙분 비, 간질 신장염, 피부점막안 증후군(스티븐스-존슨증후군), 독성표피괴사용해(리엘증후군), 방실블록 등의 심블록, 불완전 수축, 횡문근융해증, 발기부전 등이 나타나는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상 의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.