

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 조갑진균증(손, 발톱무좀)에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

손발을 씻고 건조시킨 후 취침 전에 하루에 한번 얇은 막이 형성되도록 환부에 바릅니다. 손발톱전체와 손발톱 주위 5 mm의 피부, 가능하면 손발톱끝의 아래부분에 바릅니다. 30초 정도 건조 시킨 후 적어도 6시간 동안은 씻지 않아야 하므로 취침 전에 바르도록 합니다. 이 약은 유기용매나 긁어내지 않고 물로도 충분히 제거되므로 만약 의도치 않게 물에 씻었다면 이 약을 다시 바릅니다. 정기적으로 자라난 손발톱끝 부분과 환부는 가위나 손톱깎이 등으로 잘라줍니다. 적용기간은 건강한 손발톱이 자랄 때까지 지속해야 하는데 일반적으로, 손톱의 경우는 대략 6개월 발톱의 경우는 9~12개월이 예상됩니다. 만약 효과가 없거나 환부(질환 부위)가 광범위할 경우 의사와 상담하십시오. 남아 있는 활성성분이 배양결과에 영향을 주는 것을 피하기 위해 배양검사는 치료가 끝난 후 4주 후에 합니다. 특정 연령층에 대하여 용량조절은 필요하지 않습니다. 이 약물에 내약성이 있거나 한 개이상의 손발톱에서 광범위한 침투가 있는 경우 추가적인 경구 치료를 고려해 보아야 합니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 환자, 18세 미만은 이 약을 사용하지 마십시오. 임부 또는 임신하고 있는 가능성이 있는 여성 및 수유부, 당뇨병, 면역질환, 말초동맥질환, 부상을 입거나 통증이 있거나 혹은 심각하게 손상을 입은 손톱, 건선과 같은 피부 상태나 다른 만성 피부 상태, 부종, 황색손톱증후군 환자, 인슐린 의존성 당뇨병이나 당뇨병성 신경병증 이력이 있는 환자는 사용 전에 의사 또는 약사와 상담하십시오. 만약 바르는 것을 잊어버렸을 경우라도 다음날 두 번 바르지 마십시오. 가연성이므로 열과 직접적인 화염의 접촉을 피해야 합니다.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

자극성접촉성피부염, 매우 드물게 국소적으로 홍반, 비늘, 작열감, 가려움 등이 나타날 수 있습니다.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 냉장보관하지 마십시오. 사용한 후 병마개를 잘 닫아 보관하고, 개봉 후 6개월 이상 사용은 피하십시오.