

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 2차 감염된 알레르기성 또는 염증성 피부질환(습진, 접촉피부염, 지루피부염, 아토피피부염, 광피부염, 만성단순태선, 피부스침증, 박탈피부염, 가려움, 건선)과 1도 화상에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

1일 1~3회 질환 부위에 적당량을 바릅니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 환자 또는 경험자, 세균(결핵, 매독 등)·진균(칸디다증, 백선 등)·스피로헤타속·효모·바이러스(대상포진, 단순포진, 수두, 종두증 등)·동물(곰, 사면발이 등)성 피부감염증, 고막천공이 있는 습진성 외이도염, 궤양(베체트병 제외), 제2도 심재성 이상의 화상·동상, 입주위피부염, 보통여드름, 주사 환자, 스트렙토마이신, 카나마이신, 겐타마이신, 네오마이신 등 아미노글리코사이드계 항생물질 또는 바시트라신에 과민증 또는 경험자는 이 약을 사용하지 마십시오. 이 약을 사용하기 전에 프로필렌글리콜 과민증 또는 알레르기 반응 경험자, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부, 유·소아는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 정해진 용법과 용량을 잘 지키십시오. 어린이에게 사용할 경우 보호자의 지도 감독하에 사용하십시오. 장기·대량사용 및 밀봉봉대법을 피하십시오. 안과용으로 사용하지 마십시오. 화장이나 면도 후 등 치료 이외에 목적으로 사용하지 않습니다. 3~4주 치료 후에도 증상의 개선이 없을 경우 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

피부의 세균성(전염성 농가진, 모낭염 등), 바이러스성 감염증, 모낭염, 부스럼, 피부자극, 자통, 발열, 작열감, 가려움, 발진·발적, 홍조, 피부건조, 농포성피부염, 땀띠, 상처 악화, 욕창, 농포증, 과민증, 피부변색, 다모증, 여드름상발진, 색소침착저하증, 입주위피부염, 알레르기성 접촉피부염, 피부깃무름, 2차감염, 피부위축, 줄무늬 등이 나타나는 경우 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.