

## e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 체함, 구역, 구토, 위통, 신트림, 식욕감퇴(식욕부진), 소화불량, 과식, 소화촉진에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

만 15세 이상은 1회 1포, 만 11세 이상~만 15세 미만은 1회  $\frac{2}{3}$ 포, 만 8세 이상~만 11세 미만은 1회  $\frac{1}{2}$ 포, 만 5세 이상~만 8세 미만은 1회  $\frac{1}{3}$ 포, 만 3세 이상~만 5세 미만은 1회  $\frac{1}{4}$ 포, 만 1세 이상~만 3세 미만은 1회  $\frac{1}{5}$ 포, 1일 3회 복용합니다.복용간격을 4시간 이상으로 합니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

투석요법을 받고 있는 환자, 만 3개월 미만의 젖먹이, 갈락토오스 불내성, Lapp 유당분해효소 결핍증 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 등의 유전적인 문제가 있는 환자는 이 약을 복용하지 마십시오.이 약을 복용하기 전에 알레르기 체질인 사람, 인산염 저하가 있는 사람, 혈압이 높은 환자, 심장 또는 신장장애, 부종, 고령자, 나트륨 제한 식이를 하는 사람은 의사 또는 약사와 상의하십시오.정해진 용법과 용량을 잘 지키십시오.어린이에게 투여할 경우 보호자의 지도 감독하에 투여하십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

테트라사이클린계 항생제와 함께 복용하지 마십시오.칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제와 함께 복용 시 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

변비 또는 설사, 뇨량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통, 근병증(무력감, 사지경련(떨림), 마비)등이 나타나는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.