e약은요 정보

다케다알보칠콘센트레이트액(폴리크레줄렌)

한국다케다제약(주)

공개일자: 2020-12-24 / 수정일자: 2020-12-24

"e약은요"는 일반소비자 눈높이에 맞춘 이해하기 쉬운 의약품 정보 제공을 위해 마련된 의약품개요정보 입니다. 의약품에 관한 모든 내용을 담고 있지 않으며 자세한 사항은 식약처 의약품안전나라의 "의약품상 세정보"를 참고하시기 바랍니다. 본 정보는 법적 효력을 가지는 것이 아닙니다.

- 이 약의 효능은 무엇입니까?
 - 이 약은 질 세균 감염, 구내염 및 치육염(잇몸염)에 사용합니다.
- 이 약은 어떻게 사용합니까?

질 세균 감염에 사용 시 용액을 적신 거즈를 질 안에 넣고 가벼운 압력으로 해당부위를 1~3분간 누릅니다. 3~4일 간격으로 두 번 사용하십시오.

구내염 및 치육염에 사용 시 이 약을 적신 면봉 등을 이용해 여러번 반복하여 발라줍니다.

- 이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?
- 이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?
 - 이 약에 과민증 환자는 이 약을 사용하지 마십시오.
 - 이 약을 사용하기 전에 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 - 이 약은 콘돔, 질내 피임용 격막과 같은 라텍스 또는 고무제품을 약화시킬 수 있으므로 주의하십시오.

월경 중에 사용하지 마십시오.

치료기간 중 성교를 하거나 자극적인 비누로 세척하지 마십시오.

이 약의 사용을 잊은 경우에는 용량을 보충하지 않고 그대로 다음 용량을 적용하십시오.

국소적으로만 사용하십시오.

눈에 들어가지 않도록 주의하고, 만일 눈에 들어갔을 경우 즉시 깨끗한 물로 씻어 내십시오.

구강점막이나 잇몸에 적용한 후에는 철저하게 입안을 헹구십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

다른 외용제를 함께 사용하지 마십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

국소적인 자극 및 알레르기반응, 치아의 법랑질에 손상이 나타나는 경우 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

빛을 피해 실온에서 보관하십시오.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

이 약의 적용 시 쓰이는 기구 등은 사용한 직후 소독할 때까지 물(경우에 따라 1~2 % 탄산수소나트륨을 첨가)을 담은 용기에 보관하십시오.