

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 가래 또는 기침을 유발하는 가래에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

성인 및 15세 이상의 소아는 1회 2캡슐, 8세~14세 소아는 1회 1캡슐씩, 1일 3회 식후에 복용합니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 환자 또는 경험자, 위·십이지장 궤양 환자, 8세 미만의 소아는 이 약을 복용하지 마십시오. 이 약을 복용하기 전에 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부, 노인, 알레르기 체질, 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등) 경험자, 고열, 심장질환, 간질환 또는 중증 신장(콩팥)질환 환자, 위·십이지장 궤양 경험자, 적색40호(알루라레드 AC) 과민증 환자 또는 경험자는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 정해진 용법과 용량을 잘 지키십시오. 어린이에게 투여할 경우 보호자의 지도 감독하에 투여하십시오. 3~4일간 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

다른 진해(기침을 그치게 함)·거담제(가래약), 감기약과 함께 복용하지 마십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 복통(배아픔), 두통, 혈담, 드물게 피부점막안증후군(스티븐스-존슨증후군), 독성표피괴사용해(고열을 동반하고, 발진·발적, 화상과 같은 물집이 생기는 등의 심한 증상), 속 증상(복용 후 바로 두드러기, 부기, 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함), 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨), 설사, 입안의 건조 등이 나타나는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 일시적으로 가래 양이 증가하는 경우가 있습니다.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.