

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 급·만성기관지염, 기관지천식, 후두염, 부비동염, 낭성섬유증의 질환에서 객담배출곤란에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

급성질환에 성인은 1회 1포(200 mg)씩, 1일 3회, 6~14세는 1회 1포(200 mg)씩, 1일 2회, 2~5세는 1회 $\frac{1}{2}$ 포(100 mg)씩, 1일 3회 소량의 물과 함께 복용합니다. 만성질환에 성인은 1회 1포(200 mg)씩, 1일 2회, 6~14세는 1회 $\frac{1}{2}$ 포(100 mg)씩, 1일 3회 소량의 물과 함께 복용합니다. 낭성섬유증에 6세 이상은 1회 1포(200 mg)씩, 1일 3회, 2~5세는 1회 $\frac{1}{2}$ 포(100 mg)씩, 1일 4회 소량의 물과 함께 복용합니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약은 체내에서 페닐알라닌으로 대사되는 아스파탐이 함유되어 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 페닐케톤뇨증 환자는 복용하지 마십시오.

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 환자, 위·십이지장궤양, 2세 미만 영아는 이 약을 복용하지 마십시오. 이 약을 복용하기 전에 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부는 의사 또는 약사와 상담하십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

경구용 항생물질(아목시실린, 세푸록심, 독시사이클린, 에리트로마이신, 티암페니콜)과 함께 복용 시 적어도 2시간 간격을 두고 복용하십시오. 이 약의 용액에 다른 약물의 첨가는 피하십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

드물게 구역, 구토, 구내염, 가슴쓰림, 설사, 두드러기, 가려움, 발진, 두통, 이명, 기관지경련(특히 천식 환자), 빈맥, 고혈압, 매우 드물게 아나필락시스 등이 나타나는 경우 즉각 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.