

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 기미에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

15세 이상은 1회 2정씩, 1일 2회 식후에 복용합니다. 2개월 이상 계속하여 복용하지 마십시오.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

15세 미만, 트라넥삼산을 함유하는 내복약을 복용하고 있는 사람, 트롬빈을 투여 중인 사람, 중증 신장장애 및 간성혼수가 있는 사람, 이 약에 과민증 환자, 혈전증(뇌혈전, 심근경색, 혈전성정맥염, 폐색전증 등)이 있는 사람은 이 약을 복용하지 마십시오. 이 약을 복용하기 전에 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 사람, 수유 중인 사람, 55세 이상의 사람, 알레르기 체질인 사람, 혈전증을 일으킬 우려가 있는 사람, 신장장애가 있는 사람, 시스틴뇨증이 있는 사람, 자신의 검버섯이 기미인지 아닌지 식별이 어려운 경우, 또 색이 거무스름하고, 색조가 불균일하고, 표면이 튀어나온 기미의 형태는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 복용중지 후 재발하여 재복용하는 경우 최저 2개월 간격을 두어 복용하며 이때도 2개월 이상 복용하지 마십시오. 이 약의 복용에 의해, 뇨 및 대변의 검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

트라넥삼산, 트롬빈을 복용하는 동안 이 약을 복용하지 마십시오. 이 약을 복용하기 전에 경구피임약, 호르몬 보충요법 등의 혈전증을 일으킬 우려가 있는 약을 복용하고 있는 사람은 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

이 약은 혈전(혈액이 굳어진 것)을 용해하기 어렵게 하는 작용이 있으므로 혈전증의 초기증상(심한 두통 · 허의 꼬임, 10분 이상 가슴을 죄는 듯한 통증 · 갑작스런 숨참, 한쪽 종아리의 통증 · 부종, 원인불명의 갑작스런 호흡곤란 · 가슴의 통증을 동반한 일과성의 의식 소실 등)에 주의하십시오. 발진, 가려움, 설사, 오심, 구토, 복통, 식욕부진, 가슴쓰림, 가슴이 두근거림, 두통, 현기증 등이 나타나는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.