

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 습진 · 피부염군, 피부가려움, 벌레물린데에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

사용전 잘 흔들어 섞은 후 1일 1~3회 적당량을 환부(질환부위)에 바릅니다. 증상에 따라 적절히 증감할 수 있습니다. 이 약의 치료기간은 7일 이내로 제한합니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증, 세균(결핵, 매독 등) · 진균(곰팡이)(칸디다증, 백선 등) · 바이러스(대상포진, 단순포진(물집), 수두, 종두증 등) · 동물(움, 사면발이 등)성 피부감염증, 고막 천공(뚫림)이 있는 습진성 외이도(바깥귀길)염, 궤양(베체트병 제외), 제2도 심재성(드러나지 않는) 이상의 화상 · 동상, 입 주위 피부염, 보통여드름, 주사, 비염증성 가려움 환자는 이 약을 사용하지 마십시오. 이 약을 사용하기 전에 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부, 유 · 소아(특히, 2세 미만 유아), 고령자(노인)는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 안과용, 화장이나 면도 후 등 치료 이외의 목적으로 사용하지 마십시오. 의사의 감독없이 밀봉봉대법을 사용하지 마십시오. 장기간 사용하지 마십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

피부의 세균성(전염성 농가진(고름딱지증), 모낭염 등) 및 진균(곰팡이)성(칸디다증, 백선 등) 감염증, 모낭염, 부스럼, 피부자극, 자통(찌르는 것 같은 아픔), 발열, 작열감(화끈감), 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 홍조, 가려움, 피부건조, 농포(고름물집)성피부염, 알레르기성 접촉피부염, 땀띠, 상처악화, 욕창, 농포(고름물집)증, 매우 드물게 두드러기, 피부박탈, 색소침착 변화, 적용 부위 자극 및 통증 등이 나타나는 경우 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 기타 자세한 사항은 허가사항 상세정보를 확인하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

15~30도에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.