e약은요 정보

나프젠액1%(나프티핀염산염)

현대약품(주)

공개일자 : 2021-01-29 / 수정일자 : 2021-01-29

"e약은요"는 일반소비자 눈높이에 맞춘 이해하기 쉬운 의약품 정보 제공을 위해 마련된 의약품개요정보입니다. 의약품에 관한 모든 내용을 담고 있지 않으며 자세한 사항은 식약처 의약품안전나라의 "의약품상세정보"를 참고하시기 바랍니다. 본 정보는 법적 효력을 가지는 것이 아닙니다.

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 백선(족부백선, 수부백선, 고부백선(완선), 체부백선), 피부칸디다증, 어루러기, 조갑(손톱, 발톱) 진균증에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

피부진균증에 사용하는 경우 1일 1회(가능하면 취침시) 환부를 깨끗이 닦고 완전히 건조시킨 후 환부 및 그 주위의 피부에 얇게 바르고 부드럽게 문지르십시오.

조갑(손톱, 발톱) 진균증에 사용하는 경우 손톱, 발톱을 짧게 깎고, 1일 1회(가능하면 취침시) 또는 필요에 따라 1일 2회(아침, 저녁) 얇게 바릅니다. 재발 방지를 위해 모든 증상이 소실된 후에도 약 2주간 더 사용합니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 환자는 이 약을 사용하지 마십시오.

이 약을 사용하기 전에 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부, 소아는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

의사의 지시가 없는 한 밀봉붕대법 또는 포장법을 사용하지 마십시오.

칸디다증일 경우에 산성 비누를 사용하지 마십시오.

이 약은 외용으로만 적용하십시오.

급성염증 또는 노출된 상처 부위에는 사용하지 마십시오.

눈, 코, 입 및 다른 점막에 닿지 않도록 주의하십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

다른 국소 적용 약물과 함께 사용 시 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

드물게 작열감, 찔린 상처, 건조감, 홍반, 가려움, 국소자극 등이 나타날 수 있습니다.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

실온에서 보관하십시오.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.