용법용량

성인의 대상 무릎 관절강 내에 제 1액과 제 2액을 혼합한 1키트($1.8x10^7$ cells/3mL)를 투여한다. 이 약은 무릎 강 내에 투여되는 주사제이므로, 철저한 소독을 통해 감염에 주의하여 조제하고 투여한다. 자세한 투여방법은 다음과 같다.

1) 제 1액 과 제 2액 바이알 각각을 35 ~ 37℃ (항온수조, 항온 블록, 항온 배양기 등 이용 가능)에서 3 ~ 5분간 두어 해동시킨다.

2) 바이알 상부 캡을 제거하고 고무전 부위를 베타딘 또는 유사 소독제를 이용하여 소독한다.

3) 5mL 주사기 한 개와 새로운 주사침(18~21G) 2개를 별도로 준비한다.

4) 제 1액을 5mL 주사기에 전량 충진한다.

5) 장착된 주사침을 제거한 후 새로운 주사침(18~21G)을 제 1액이 충진된 주사기에 장착한다.

6) 제 1액이 충진된 5mL 주사기로 제 2액을 전량 충진한다.

7) 주사기를 손으로 조심스럽게 탭핑하여 세포가 고르게 부유될 수 있도록 하며, 가급적 거품이 나지 않게 조심 한다.

8) 장착된 주사침을 제거한 후 새로운 주사침(18~21G)을 장착한다.

9) 전체 충진량 중에서 3mL만 남기고 나머지는 버린다.

10) 이렇게 준비된 인보사®-케이주(INVOSSA®-K inj.) 3mL를 무릎 관절강 내에 천천히 주사한다.

11) 하루 입원을 하면서 경과를 지켜보는 것을 권장하며, 입원 여건이 안되는 경우, 최소한 2시간은 휴식을 취하면서 신중히 관찰해야 한다.