

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 폴산결핍증의 예방 및 치료, 소모성 질환, 임부 및 수유부에서 폴산의 수요가 증대하여 식사로부터 섭취가 불충분한 경우의 보급, 악성빈혈의 보조요법(비타민 B12 결핍으로 인한 빈혈 제외), 영양결핍성빈혈, 임신성빈혈, 소아빈혈, 항전간제 투여로 인한 빈혈 중 폴산의 결핍 또는 대사장애가 관여한다고 추정되는 경우, 알코올중독 및 간질환에 관련된 거대적아구성빈혈에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

폴산결핍증, 다른 약물 투여로 인한 결핍증 치료 경우 성인 및 24개월 이상 소아는 1일 0.25~1 mg을 복용합니다. 폴산결핍증 예방 및 폴산의 요구량이 증대하는 각종 질환 경우 성인 및 24개월 이상 소아는 1일 0.1~0.25 mg을 복용합니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 환자, 비타민 B12 결핍으로 인한 악성빈혈 또는 거대적아구성빈혈, 갈락토오스 불내성, Lapp 유당분해효소 결핍증 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 등의 유전적인 문제가 있는 환자는 이 약을 복용하지 마십시오. 이 약을 복용하기 전에 악성빈혈 환자는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 정해진 용법과 용량을 잘 지킵시오. 어린이에게 투여할 경우 보호자의 지도 감독하에 투여하십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

아미노살리실산, 경구용 피임제, 디하이드로폴레이트 환원효소 저해제(메토틱세이트, 트리메토프림 등), 페니토인 같은 히단토인계 항전간제, 설파살라진, 콜레스티라민을 복용 중인 환자는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

홍반, 피부발진, 가려움, 전신권태, 호흡곤란 등의 알레르기 증상 및 아나필락시스 반응, 식욕부진, 구역·구토, 부종, 체중감소, 위장관장애, 수면변화, 집중부족, 과잉행동, 과민성, 흥분, 우울증, 혼란, 판단력 장애 등의 중추신경장애 등이 나타나는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.