

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 급성 상기도 감염으로 인한 발열 시 해열에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

생후 6개월 이상의 소아는 1회 0.4~0.6 mL/kg(5~7 mg/kg)씩, 4~6시간 간격으로 필요시에 복용하며, 1일 최대 4회(28 mg/kg)를 넘지 않습니다. 몸무게를 알 경우 몸무게에 따른 용량으로 복용하는 것이 더 적절하므로 연령대별 권장용량은 허가사항을 참고하십시오.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

매일 세잔 이상 정기적 음주자가 이 약 또는 다른 해열진통제를 복용할 때는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 위장출혈을 일으킬 수 있습니다. 이 약 복용 시 치명적일 수 있는 중대한 심혈관계 혈전 반응, 심근경색증 및 뇌졸중의 위험이 증가하며, 위장관 출혈, 궤양 및 천공 등 심각한 위장관계 이상반응이 나타날 수 있습니다.

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증, 소화성궤양, 심한 혈액이상, 심한 간장애, 심한 신장애, 심한 심기능부전, 심한 고혈압, 기관지 천식 또는 경험자, 아스피린이나 다른 비스테로이드성 소염진통제(COX-2 저해제 포함)에 대하여 천식, 두드러기 또는 알레르기 반응 경험자, 관상동맥 우회로술(CABG) 전후에 발생하는 통증의 치료 환자, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부는 이 약을 복용하지 마십시오. 이 약을 복용하기 전에 소화성 궤양 경험자, 혈액이상 또는 경험자, 출혈경향이 있는 환자(혈소판 기능 이상이 일어날 수 있다.), 간장애 또는 경험자, 신장애 또는 경험자, 심기능부전, 고혈압, 과민증의 기왕력이 있는 환자, 전신성 홍반성 루푸스(SLE) 및 혼합결합조직질환(MCTD), 궤양성 대장염, 크론병 환자, 고령자 및 소아, 위암 환자, 심근경색이나 뇌졸중 예방목적으로 저용량 아스피린을 복용하는 사람은 의사 또는 약사와 상의하십시오. 급성질환에 장기 복용할 경우에는 원칙적으로 5일 이내로 합니다.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

다른 비스테로이드성 소염진통제, 아스피린, 고용량의 메토틱세이트와 함께 사용하지 마십시오. 글루코코르티코이드, 알코올, 디곡신, 페니토인, 프로베네시드, 설핀피라존, 설폰닐우레아제, 이뇨제와 항고혈압제 병용, ACE 억제제, 푸로세미드, 리튬, 저용량의 메토틱세이트, 쿠마린계 항응고제(와파린 등)와 함께 사용 시 의사 또는 약사와 상담하십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

때때로 식욕부진, 구역, 구토, 복통, 소화불량, 설사, 위부불쾌감, 발진, 가려움증, 안와주위부종, 드물게 속(흉내고민, 오한, 호흡곤란, 혈압저하 등), 재생불량성빈혈, 용혈성빈혈, 과립구감소, 혈소판감소, 혈소판기능저하(출혈시간 연장), 호산구증다 등의 혈액장애, 소화성궤양 위장출혈, 천공, 궤양성대장염, 혈변, 위염, 췌장염, 스티븐스-존슨증후군(피부점막안증후군) 또는 리엘증후군(독성표피괴사용해), 황달, GOT, GPT, ALP 상승, 천식발작의 유발, 두드러기, 습진, 자반, 무시, 암침 등의 시각장애, 난청, 이명, 미각이상, 무균성 수막염, 심한 두통, 구역, 구토, 불면, 목이 뻣뻣함, 발열 또는 의식장애, 혈압저하, 혈압상승, 심계항진, 핏뇨, 혈뇨 등의 증상 및 뇨단백, BUN, 혈중 크레아티닌의 상승, 고칼륨혈증, 요량감소, 전신부종, 숨가쁨, 나른함, 급성 폐부종, 매우 드물게 구갈, 구내염, 복부팽만감, 변비, 권태감, 발열, 비출혈, 빈도불명의 호산구 증가 및 전신 증후군을 동반한 약물 발진(DRESS 증후군), 급성전신발진고름물집증(AGEP) 등이 나타나는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

빛을 피해 상온(15~25 ℃)에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.