

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 퇴행성 관절염(골관절염), 어깨관절 주위염, 힘줄 및 힘줄윤활막염, 힘줄주위염, 위팔뼈상과염(테니스엘보 등), 근육통(근, 근막성, 허리통증 등), 외상(상처) 후 부기 및 통증의 진통·소염에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

15세 이상의 성인은 1회 1매씩, 1일 1회 환부(질환 부위)에 붙이십시오.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 경험자, 아스피린 또는 기타의 비스테로이드 소염제(항염증제) 천식 및 과민반응 환자 또는 경험자, 15세 미만의 어린이, 임신 3기, 수유부는 이 약을 사용하지 마십시오. 이 약을 사용하기 전에 기관지 천식 환자, 감염을 동반한 염증 및 만성질환(퇴행성관절염(골관절염) 등)에 사용하는 경우, 임부(임신 1기 및 2기), 임신이 어렵거나 불임검사를 받고 있는 여성, 고령자는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 눈 및 점막, 손상된 피부, 습진 또는 발진이 난 부위에는 사용하지 마십시오. 밀봉봉대법으로 사용하지 마십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

이 약을 사용하는 동안 디클로페낙 제제 혹은 비스테로이드 소염제(항염증제)를 국소적으로 적용하거나 복용하지 마십시오. 뉴퀴놀론계 항균제(에녹사신 등), 루프 이뇨제(푸로세미드 등), 티아자이드계 이뇨제, 지혈을 방해하는 약물(와파린 등), 항혈소판제(아스피린 등), 선택적 세로토닌 재흡수 억제제 및 세로토닌 노르에피네프린 재흡수 억제제를 투여하는 환자는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

때때로 피부염, 가려움, 충혈되어 붉어짐, 거칠어짐, 자극감 등이 나타나는 경우 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 피부에 손상이 있을 경우 사용하면 일시적인 자극 및 저린감을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오. 광선과민반응, 부종(부기), 피부박탈, 습진, 피부건조, 드물게 수포형성, 색소침착, 매우 드물게 과민반응, 혈관신경성 부종(부기), 천식 등이 나타나는 경우 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 탈락성 피부염, 스티븐스-존슨 증후군 및 독성 표피괴사 같은 중대한 피부 이상반응, 위 또는 장관의 출혈, 궤양 및 천공을 포함하는 중대한 위장관계 이상반응이 나타나는 경우 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.