

용법용량

이 약은 외용으로 일회용으로만 사용한다.

이 약은 알코올을 함유하고 있어 인화성 증기를 발산하므로 화기를 가까이 하지 말고 환기가 잘 되는 곳에서 사용한다. 액이 완전히 마를 때까지 덮거나 발화원(예: 전기소작술, 레이저 등)을 사용하지 않는다(털이 없는 피부는 최소 3분, 털이 있는 경우 1시간까지). 젖은 물건은 처치 부위에서 치운다.

액이 고이지 않도록 한다: 처치용 타월을 밑에 넣어 액을 흡수시킨 후 제거한다.

어플리케이션 한 개당 1mL, 1.5mL, 3mL, 10.5mL 또는 26mL의 소독액이 들어 있다.

- 어플리케이션 한 개당 최대 처치 면적은 아래와 같다:

어플리케이션		최대 처치 면적
 1mL	 1.5mL	약 6.5 × 6.5 cm (42cm ²)
 3mL		약 10.2 × 12.7 cm (130cm ²)
 10.5mL		약 21.4 × 21.4 cm (457cm ²)
 26mL		약 33.5 × 33.5 cm (1126cm ²)

어플리케이션 사용 방법

어플리케이션은 라텍스를 함유하지 않은 스폰지가 부착된 플라스틱 통 안에 소독액이 담긴 유리 앰플 한 개 (26mL 제품은 유리 앰플 두 개)가 들어 있는 형태로 구성되어 있다. 무균 상태의 어플리케이션이 투명 필름에 개별 포장되어 있다.

- 어플리케이터의 포장을 벗기고 스폰지가 아래를 향하도록 잡는다. 어플리케이터의 스폰지 부분을 만지지 않는다.
- 앰플이 부서져 약액이 나올 수 있도록 어플리케이터를 한 번만 째 눌러 쥔다. 부서진 앰플은 어플리케이터 안에 안전하게 남아 있게 된다.:
- 26mL : 손잡이의 레버를 째 눌러 쥔다.
- 그 외 제품 : 양 날개를 째 눌러 쥔다.
- 스폰지를 빠르게 적시기 위해 날개를 반복해서 쥐거나 눌러대지 않는다.
- 피부 위에 액이 보일 때까지 처치 부위에 대고 스폰지를 눌렀다 놓았다 하면서 스폰지를 적신다. 처치 부위를 약액으로 완전히 적게 한다.
 - 건조한 수술 부위(예: 복부 또는 팔): 피부 위에 액이 보이면 해당 부위 처치를 위해 부드럽게 앞뒤로 30초 동안 문지른다.
 - 습한 수술 부위(예: 살굴주름): 약 2분 동안 부드럽게 반복해서 앞뒤로 문지른다.
- 26 mL 어플리케이터에는 면봉 2개가 동봉되어 있다. 필요시에는 동봉된 면봉으로 온전한 상태의 배꼽을 소독한다(액이 적혀진 어플리케이터의 스폰지에 대고 눌러서 면봉을 적신다).
- 액이 도포된 부위는 공기 중에서 완전히 말린다. 약액을 닦아내 버리지 않는다.
- 어플리케이터는 일회 사용 후 처치 부위 도포에 사용하지 않은 남은 약액과 함께 폐기한다. 반드시 전량을 사용해야 하는 것은 아니다.