

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 세균성 치은염(잇몸염), 구강 점막의 세균성 염증과 치주 수술 후 경우의 일시적 보조요법으로 사용됩니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

이 약을 사용하기 전에 양치를 하고 충분한 물로 입 안을 헹구십시오. 1일 2~3회, 식사 및 양치 후 입안 염증 부위에 이 약의 적정량을 노즐을 사용하여 직접 도포하고 1분 정도 방치한 후 뱉습니다. 이 약을 삼키지 마십시오.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

구강 내 정상 세균총의 불균형을 일으킬 수 있으므로 장기간 사용하지 마십시오.

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 환자는 이 약을 사용하지 마십시오. 이 약을 사용하기 전에 기관지 천식 또는 기도의 과민반응과 관련된 기타 호흡기 질환, 알레르기 질환 환자, 임부, 수유부, 18세 미만의 소아는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 내복용으로 사용하지 마십시오. 눈 또는 귀 주변부위에 사용하지 않으며, 실수로 도포되었을 경우 물로 충분히 씻어내십시오. 혈액순환이 원활하지 않은 조직 또는 상처 및 궤양(궤양화)는 물론 외적으로 출혈 없는 상처 부위(부식성 박리 변화)에 사용하지 마십시오. 이 약을 과다 도포하였을 경우 물로 세척하여 제거하십시오. 치아표면, 보철물, 혀의 뒷면과 같은 구강표면에 착색을 일으킬 수 있습니다.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

이 약은 비누 또는 일반적인 치약 구성 성분인 음이온물질과 잘 배합되지 않으므로 이 약을 해당 성분과 동시에 사용하지 않고 양치를 한 후 구강을 충분한 물로 세척하고 적어도 5분 후에 이 약을 사용하십시오. 이 약의 사용 이후 설탕이 포함된 음식 또는 음료 섭취를 자제하십시오. 설탕은 이 약의 효과를 저해시킬 수 있습니다.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

드물게 과민반응(발진, 입술, 혀, 목 또는 얼굴의 부종, 호흡 곤란) 등이 나타나는 경우 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 구강 점막의 특정한 병변과 같은 점막의 일시적 박리 변화, 미각 저하 및 회복 가능한 혀의 무감각 상태 등이 나타날 수 있습니다.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.